

'Унивок® – protezione extraterrestre contro le malattie dei cereali'

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 24.03.2023 Брой: 3/2023



„Извънземна“ защита от болести

Фунгцида di **Corteva Agriscience™** con una nuova sostanza attiva **Inatreq™ active**, un nuovo modo di azione e una nuova **formulazione iQ-4**

UNIVOC® è un nuovo fungicida che offre un'azione eccezionale preventiva, di blocco e curativa contro tutte le malattie economicamente importanti nelle colture cerealicole. È un fungicida a due componenti, doppiamente sistemico, contenente prothioconazolo, uno dei triazoli più recenti, con azione sistemica, eradicante e preventiva mirata al controllo delle malattie dei cereali, comprese le ruggini, le maculature fogliari e la fusariosi, e la nuovissima sostanza attiva **Inatreq™ active** appartenente a un nuovo gruppo chimico e con un nuovo modo di azione contro un ampio spettro di malattie, il cui vantaggio più significativo è che rappresenta il nuovo punto di

referimento contro le specie di *Septoria* e uno strumento per la gestione della resistenza contro questo patogeno. I principi attivi in **UNIVOC®** si completano a vicenda in un cosiddetto effetto sinergico, che offre agli agricoltori un nuovo strumento per controllare tutte le malattie delle colture cerealicole.

Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

НОВ!

Начин на действие

Инхибира митохондриалното дишане

Произведеното количество на аденозин трифосфат (АТР) е намалено и защото АТР е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и губите умират.

Inatreq™ active è una molecola creata a partire dall'attinomicete *Streptomyces* e da una successiva fermentazione. Questo fatto dimostra l'effetto favorevole del prodotto sull'ambiente e sulle colture.

UNIVOC® garantisce un'eccellente durata della protezione, sufficiente a salvaguardare le colture anche sotto la più alta pressione infettiva, combinata con un effetto fisiologico espresso nella stimolazione della fotosintesi, nel blocco dell'ormone etilene che si forma nella coltura in condizioni di stress, nella stimolazione della formazione delle radici e, su questa base, nell'aiutare la coltura a realizzare il suo massimo potenziale produttivo e a raggiungere parametri qualitativi elevati della granella.



Отличен в класа си

<i>Septoria tritici</i> Септория по листата	<i>Drechslera / Helminthosporium</i> Мрежести петна
<i>Puccinia striiformis</i> Жълта ръжда	<i>Erysiphe graminis</i> Брашнеста мана
<i>Puccinia recondita</i> Кафява ръжда	<i>Pseudocercospora</i> Базично пълнене
<i>Fusarium spp.</i> Фузариум по класа	<i>Rhynchosporium secalis</i> Листен пригор

Унивок®
Inatreq active
ФУНГИЦИД

НОВ!

Secondo gli agricoltori che hanno utilizzato **UNIVOC®** nel 2022, il fungicida garantisce un controllo eccellente dell'oidio, della maculatura bruna delle foglie, della fusariosi, del mal del piede, della ruggine bruna, della ruggine gialla, del marciume da neve, della peronospora precoce e della septoriosi. **UNIVOC®** viene applicato a dosi flessibili in base al momento del trattamento, come segue: T1 – 120 ml/da; T2 – 130 ml/da e T3 per la protezione dalla fusariosi a un dosaggio da 130 a 150 ml/da.

Grazie al suo nuovo modo di azione, **UNIVOC®** non presenta resistenza incrociata con altri fungicidi, il che lo rende una nuova arma anti-resistenza per il controllo delle malattie primaverili delle colture cerealicole.

UNIVOC® si trova in una formulazione speciale basata sulla tecnologia iQ-4 per una migliore adesione e penetrazione nelle parti vegetali della coltura e per una protezione più duratura contro i patogeni.

La tecnologia iQ-4 è una formulazione di recente brevettata contenente un sistema di adiuvanti appositamente progettato.

Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

Продължителна и сигурна защита



До 6 седмици след третиране в
зависимост от условията



Нетретирана контрола



Унивок®

I vantaggi includono:

- Distribuzione e copertura migliorate sulla superficie fogliare anche con bassi volumi d'acqua
- Penetrazione e ridistribuzione migliorate nei tessuti vegetali
- Garantisce una copertura del 97,5% delle parti della pianta
- Otto giorni dopo il trattamento, il 90% del prodotto è ancora presente sulle parti della pianta
- Attività prolungata e affidabile fino a 6 settimane dopo il trattamento, a seconda delle condizioni meteorologiche