

Durante la terza decade di aprile, le condizioni saranno favorevoli per un aumento del fondo infettivo di una serie di malattie fungine.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



Nel corso del prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo variabile con frequenti precipitazioni, che manterranno un livello molto buono delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e buone condizioni per la vegetazione delle colture autunno-vernine e delle nuove semine primaverili. Le precipitazioni significative cadute durante la prima e la seconda decade di aprile nella maggior parte del paese hanno superato le norme mensili (Vidin - 61 l/m², Vratsa - 84 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Shumen - 86 l/m², Dobrich - 80 l/m², Haskovo - 77 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Elhovo - 91 l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) e hanno migliorato le riserve di umidità anche

negli strati più profondi del suolo. Alla fine della seconda decade, nella maggior parte delle aree coltivate, le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm per le colture cerealicole invernali hanno raggiunto livelli superiori all'80-85% della capacità di campo.

Nella maggior parte dei giorni del prossimo periodo, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo moderato, con temperature vicine alle norme climatiche e, verso la fine del periodo, leggermente al di sotto. Durante il periodo, il frumento si troverà prevalentemente nella fase di allungamento del culmo, e nell'orzo, in alcune località della Pianura Danubiana (stazione agrometeorologica di Novachene), si osserverà anche l'inizio della spigatura. Il colza invernale sarà prevalentemente in fase di fioritura. Nelle colture di girasole e mais, a seconda delle date di semina, si osserveranno l'emergenza e la formazione delle foglie.

Nel Nord-Centro e Nord-Ovest della Bulgaria, ancora a causa delle piogge prolungate e delle condizioni climatiche sfavorevoli, la semina sta subendo ritardi. I produttori hanno assicurato le sementi necessarie, le aree sono state preparate e, in condizioni favorevoli, gli agricoltori sono pronti a seminare alla prima opportunità. Le superfici seminate finora sono molto ridotte rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Le frequenti precipitazioni previste durante la terza decade di aprile creeranno le condizioni per un aumento della pressione di infezione da una serie di malattie fungine: septoriosi e ruggine fogliare nei cereali invernali; negli alberi da frutto – moniliosi dei fiori (marrume bruno precoce), corineo, bolla del pesco, ticchiolatura, il che richiede, alla prima opportunità dopo la cessazione delle precipitazioni, l'applicazione tempestiva di misure di protezione delle piante.

Fonte: NIMH