

All'inizio di maggio – condizioni per la formazione del gelo negli alti campi e bacini

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2023 *Брой:* 5/2023



Le diffuse precipitazioni verificatesi nella seconda metà di aprile hanno mantenuto buoni livelli di riserva di umidità del suolo per le colture agricole nello strato di 50 cm, tra l'80 e il 90% della capacità di campo (CC).

Durante il prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche continueranno a essere determinate da un tempo instabile. I processi vegetativi nelle colture agricole procederanno a un ritmo moderato con temperature medie giornaliere vicine o inferiori alle norme climatiche per la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il frumento invernale si troverà prevalentemente nella fase di allungamento del culmo. La colza continuerà la sua fase di fioritura. Nel mais e nel girasole si osserveranno l'emergenza e l'inizio della formazione delle foglie.

Nelle specie arboree da frutto avverranno la fioritura, l'emissione delle foglie e l'allegagione. Nella vite si osserverà lo sviluppo di 1-3 foglie.

Il tempo instabile del periodo, con frequenti rovesci, ostacolerà l'esecuzione delle lavorazioni del terreno pre-semina e della semina delle colture primaverili più tardive, nonché l'attuazione dei trattamenti fitosanitari. Dopo la cessazione delle precipitazioni, sono raccomandati trattamenti preventivi contro la peronospora e l'escoriosi della vite, la ticchiolatura delle pomacee, il marciume bruno dei fiori (monilia precoce) e la corineo delle drupacee, e contro la bolla del pesco.

All'inizio del periodo, nei campi e nelle conche più elevati, si verificheranno condizioni favorevoli alla formazione di gelate al suolo e al danneggiamento delle colture agricole.

Fonte: NIMH