

Luglio – una prova per le colture agricole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Nella maggior parte dei giorni della prima e della seconda decade di luglio, le condizioni agrometeorologiche continueranno a essere determinate da tempo instabile, con frequenti precipitazioni, che ostacoleranno l'attività più importante della stagione – la raccolta del grano e i trattamenti tempestivi contro malattie e parassiti nelle colture agricole. Le piogge di giugno superiori alla norma nella maggior parte del paese, ad eccezione delle regioni sudorientali, hanno peggiorato lo stato fitosanitario delle colture orticole e degli alberi da frutto, e in alcuni luoghi delle regioni occidentali hanno compromesso le rese delle ciliegie.

Durante la prima e la seconda decade di luglio, è prevista nuovamente un'elevata probabilità di precipitazioni intense, sostanziali e di grandine – un'ulteriore sfida per le colture agricole e un rischio di dispersione del raccolto di grano maturo. In questo periodo, la vegetazione delle colture primaverili con buona disponibilità idrica

procederà a un ritmo moderato, con temperature medie giornaliere vicine alle norme climatiche. Nel mais, a seconda della sua precocità, si osserveranno diverse fasi: formazione delle foglie, emissione della pannocchia, fioritura della pannocchia ed emissione delle setole. Nel girasole, nelle aree di campo, avverranno la fioritura, la fecondazione e il riempimento della granella.

Durante la terza decade, lo sviluppo delle colture agricole procederà nelle tipiche condizioni calde della fine di luglio. In questo periodo sono previste temperature massime estremamente elevate, in alcuni luoghi fino a 38-39°C, che influenzeranno negativamente la fioritura e la fecondazione nelle colture orticole e negli ibridi di mais più tardivi. Durante la decade, gli ibridi di mais precoci entreranno nella fase di maturazione lattea. Nel girasole seminato nei tempi agrotecnici, in alcuni luoghi della Pianura Danubiana, si osserverà l'inizio della fase di maturazione.

Le previsioni di tempo relativamente secco e caldo durante la terza decade di luglio limiteranno lo sviluppo di numerose malattie fungine, ad eccezione degli oidii negli alberi da frutto, nelle colture orticole e nelle viti. Nelle colture frutticole, il controllo della seconda generazione delle tignole non deve essere sottovalutato. I trattamenti contro malattie e parassiti devono essere effettuati durante le ore più fresche della giornata, utilizzando prodotti fitosanitari con un appropriato intervallo pre-raccolta, in linea con il periodo di maturazione delle colture.

Fonte: NIMH