

Nel frutteto a luglio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



A luglio, nei **frutteti di melo** dove non si è verificata infezione da ticchiolatura, i trattamenti contro questa malattia vengono sospesi. In presenza di infezione su foglie e frutti e con frequenti piogge, il rischio di infezioni tardive e di un aumento del grado di danneggiamento dei frutti persiste, il che in questo caso rende necessari i trattamenti anche in questo periodo.

Per le cultivar di melo suscettibili all'oidio, proseguono anche i trattamenti contro questa malattia. Per il controllo simultaneo di entrambe le malattie, si utilizza uno dei seguenti fungicidi: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da e Kumulus – 600–900 g/da contro l'oidio, e Chorus 50 WG – 0,03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da e Captan 80 WG – 150–180 g/da contro la ticchiolatura. Per il controllo simultaneo

di entrambe le malattie, sono adatti i seguenti: Flint Max 75 WG – 0,02%, Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Per prevenire l'insorgenza di resistenza del fungo che causa la ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), è meglio alternare prodotti con diversi modi d'azione sul patogeno o utilizzare miscele di fungicidi per il suo controllo.

Le cultivar resistenti alla ticchiolatura – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, ecc., vengono trattate solo contro l'oidio.

Per il **pero**, devono essere continuati i trattamenti contro la ticchiolatura e le maculature fogliari bianche e brune. Per il controllo di queste malattie, si utilizza uno dei seguenti fungicidi: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Per il **susino** a luglio, i trattamenti sono diretti contro la moniliosi e la ruggine. Contro la moniliosi, il trattamento viene effettuato con uno dei seguenti fungicidi: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0,045%, Geoxe – 40–60 g/da. Contro la ruggine, è autorizzato Signum WG – 45 g/da, che è efficace anche contro la moniliosi.

All'inizio di luglio, i frutti delle cultivar precoci di pesco iniziano a maturare e in questo periodo non vengono trattati. Per le **cultivar tardive di pesco**, continua il controllo dell'oidio, della corineosi e della moniliosi. Contro l'oidio, si utilizza uno dei seguenti fungicidi: Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0,03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Per il controllo della moniliosi, il trattamento viene effettuato con Delan 700 WDG – 0,05%, Chorus 50 WG – 0,045% o Luna Experience – 63–75 ml/da.



A luglio maturano le albicocche e non vengono trattate.

Per il **lampone**, in questo periodo non si effettuano trattamenti, ad eccezione delle **cultivar rifioventi** come Lyulin. Per queste, sono necessari trattamenti contro la didimella e l'antracnosi. Si utilizza uno dei seguenti fungicidi: Signum WG – 100 g/da e Funguran OH 50 WP – 0,15%. Con frequenti piogge ed elevata umidità dell'aria, è necessario anche il trattamento contro la muffa grigia. Si utilizza Switch 62.5 – 100 g/da.

Dopo la raccolta, le foglie delle **fragole** vengono tagliate, rimosse dalla piantagione e distrutte mediante bruciatura o interrate in modo che si decompongano.