

Alla fine di luglio e all'inizio di agosto – lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alle norme climatiche e in condizioni di deficit di umidità del suolo.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023



Il clima caldo durante la maggior parte dei giorni della terza decade di luglio, con temperature massime estremamente elevate fino a e oltre i 40-42°C, ha interrotto il normale corso dei processi vegetativi nelle colture agricole. Questi valori hanno causato stress da calore e scottature fogliari in parte delle colture primaverili tardive, e una caduta prematura delle foglie negli alberi da frutto. (Presso la stazione agrometeorologica di Silistra si osserva un ingiallimento prematuro delle foglie nel 50% delle coltivazioni di mais cresciute in condizioni non irrigue).

Dopo il breve ma significativo raffreddamento alla fine dello scorso periodo settimanale, durante gli ultimi giorni di luglio e l'inizio di agosto lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alle norme climatiche e in condizioni di deficit di umidità del suolo. Le precipitazioni alla fine di luglio sono state di carattere locale e nella maggior parte del paese, ad eccezione di alcune località nelle regioni nordoccidentali (N. Selo, Lom, Knezha, Pleven) e sudorientali (Sliven, Karnobat, Burgas), sono state insignificanti, inferiori a 10 l/m². Nel periodo successivo non sono previste precipitazioni di rilevanza agronomica, e l'applicazione di un adeguato regime di irrigazione rimane una misura prioritaria per le colture agricole tardive. All'inizio di agosto, gli ibridi di mais precoci entreranno nella fase di pastoso, negli ibridi mediamente precoci si osserverà la fase lattea, e negli ibridi di mais più tardivi avverranno la formazione e il riempimento della granella. Nel girasole, in alcune parti della Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali, procederà la fase di maturazione.

Alla fine di luglio e all'inizio di agosto, i trattamenti fitosanitari dovrebbero essere effettuati durante le ore più fresche, utilizzando prodotti con un intervallo pre-raccolta adeguato, coerente con il periodo di maturazione delle colture. Nei frutteti, il controllo della seconda generazione di tignole della frutta non dovrebbe essere sottovalutato. Si raccomanda di trattare le colture orticole colpite dalle grandinate verificatesi alla fine del periodo scorso con fungicidi a base di rame.

Fonte: NIMH