

Nella seconda metà di ottobre, è previsto un miglioramento delle condizioni idrofisiche dello strato superficiale del suolo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



L'assenza di precipitazioni durante la prima e l'inizio della seconda decade di ottobre ha portato a un approfondimento della siccità in corso. Nella maggior parte delle regioni arabili del paese, non c'è umidità produttiva nello strato di suolo di 50 cm, e in alcune aree della Bulgaria sud-occidentale (stazione agrometeorologica di Kyustendil) – nell'intero strato di un metro.

Dopo le previsioni di tempo secco e stagionalmente caldo fino a metà ottobre, durante la seconda metà della seconda decade le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento. In questo periodo sono attese

precipitazioni diffuse, in alcuni luoghi fino a 15-20 l/m², un miglioramento dello stato idrofisico dello strato superficiale del suolo e delle condizioni per eseguire le lavorazioni presemina ritardate delle aree destinate alla semina delle colture invernali. A causa della siccità, in molti luoghi delle regioni arabili sono stati persi i termini agrotecnici di settembre per la semina della colza invernale. Sono attesi ritardi anche nella semina delle colture cerealicole invernali. A metà ottobre scadono i termini ottimali per la semina del grano nella Bulgaria settentrionale. Nel periodo successivo iniziano i termini agrotecnici per la semina delle colture cerealicole invernali nelle regioni meridionali del paese.



La siccità in Dobrugia ostacola la preparazione delle aree per la semina autunnale del grano. I termini ottimali per la posa dei semi della nuova coltura sono fino alla fine di ottobre, secondo gli scienziati dell'Istituto Agricolo di Dobrugia – General Toshevo.

Il periodo di semina dipende fortemente dalle condizioni climatiche. Negli ultimi anni non è stato raro che la campagna di semina continuasse fino a novembre. Allo stesso tempo, le condizioni delle colture dipendono fortemente da quali saranno le temperature e le precipitazioni a novembre e dicembre e in che misura le piante si induriranno per svernare.

Le precipitazioni previste durante la seconda metà del prossimo periodo dovrebbero fornire l'umidità necessaria per le fasi iniziali della vegetazione delle colture autunnali. Alla fine della seconda decade di ottobre, nelle

colture cerealicole invernali seminate (stazione agrometeorologica di Targovishte) sarà in corso la fase di germinazione e formazione iniziale delle foglie.

Condizioni favorevoli per completare la vendemmia e per la raccolta delle varietà di frutta autunnali si verificheranno all'inizio e alla fine del periodo.

Fonte NIMH