

Tempo per la piantagione autunnale dei lamponi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 Брой: 11/2023



Il lampone presenta numerosi vantaggi rispetto ad altre specie frutticole: fiorisce più tardi, non soffre le gelate primaverili e fruttifica ogni anno. I suoi frutti sono gustosi, nutrienti, con buone proprietà medicinali. Rafforzano l'attività cardiaca, arricchiscono l'organismo di vitamine e sostanze minerali e aumentano l'appetito. Sono noti per il loro effetto antipiretico, dovuto alla presenza di acido salicilico.

La scelta del sito per la piantagione di lamponi viene effettuata in base alle esigenze della coltura per le condizioni climatiche e del suolo. La preparazione del terreno pre-impianto include un'aratura a 30–35 cm, una lavorazione superficiale per l'incorporazione dei fertilizzanti e una sarchiatura. Viene applicato letame.

Il periodo più adatto per la piantagione è dalla fine di ottobre fino all'inizio del freddo. La piantagione è possibile anche in primavera – fino alla fine di marzo. La distanza tra le file è compresa tra 1,8 e 2 m. La piantagione viene effettuata manualmente in solchi con una profondità di circa 35 cm.

Le nuove piantagioni vengono concimate con 8–10 kg/da di azoto, e quelle in fruttificazione con 8–12 kg/da. Nei terreni più pesanti, l'azoto viene applicato una volta, all'inizio della primavera, mentre se sono più leggeri, all'inizio della primavera e alla fine di maggio. La concimazione di copertura per le piantagioni in fruttificazione viene effettuata dopo la fioritura. Se le precipitazioni sono insufficienti, viene applicata l'irrigazione secondo necessità fino a metà agosto. La potatura viene effettuata ogni anno, durante la quale vengono rimossi i tralci fruttiferi di due anni e vengono diradati i tralci di un anno. Nel secondo anno dopo la piantagione, vengono lasciati 2–3 tralci per pianta per la fruttificazione e i rimanenti vengono tagliati bassi. Nel terzo e quarto anno, il numero di tralci fruttiferi aumenta e le piantagioni entrano in piena fruttificazione. In primavera, la potatura viene effettuata al rigonfiamento delle gemme, rimuovendo quelle danneggiate dalle gelate invernali, dalle malattie e dai parassiti.

Cura dei piccoli frutti semi-arbustivi durante l'estate

I lamponi sono danneggiati dalle malattie come la didimella, il cancro dei tralci, la ruggine, l'antracnosi, e tra i virus – il mosaico e la clorosi delle nervature. I parassiti più comuni del lampone sono il cetoni del lampone, gli afidi, l'Agrilus, il cecidomide del lampone, la mosca galligena del lampone.



In Bulgaria, le seguenti cultivar di lampone sono le più diffuse:

Lyulin – i frutti maturano dal 27 agosto al 3 ottobre. Sono grandi, di un rosso intenso, lucidi, sodi, con gusto molto buono e aroma moderato. Le piante sono vigorose e a crescita moderata. La cultivar è altamente produttiva e può essere coltivata senza strutture di sostegno.

Willamette – una cultivar americana moderatamente produttiva. I frutti maturano nel periodo 6–8 luglio. Sono di media grandezza, conici con semi piccoli. Hanno un buon gusto agrodolce e aroma. Le piante sono a crescita moderata e vengono coltivate nelle regioni più fresche in condizioni irrigue.

Bulgarski Rubin (Rubino Bulgaro) – i frutti maturano nel periodo 28–30 giugno. Sono di media grandezza, leggermente conici, di un rosso rubino, non si sfaldano in singole drupeole e hanno un piacevole gusto agrodolce e aroma moderato. La cultivar è altamente produttiva.

Shopska Alena – i frutti maturano nel periodo 3–5 luglio. Sono da medi a grandi, ottusamente conici, di un rosso brillante, con lucentezza moderata e semi piccoli. Si staccano facilmente, con un gusto agrodolce molto buono e aroma moderato. Sono adatti per la trasformazione e il congelamento. Le piante sono a crescita forte, leggermente ricoperte di piccole spine. La cultivar è altamente produttiva.

