

Gennaio inizia con temperature insolitamente alte

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 *Брой:* 1/2024



Le anomalie climatiche all'inizio dell'inverno, con temperature insolitamente elevate superiori ai 20-21°C in molte località, hanno portato a una ripresa dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno in alcune parti delle regioni arabili del paese. Il clima insolitamente caldo ha causato, in alcune delle regioni sud-occidentali più estreme, un rigonfiamento prematuro e indesiderato delle gemme in alcune specie arbustive e da frutto a fioritura precoce come il corniolo, l'albicocco, il pesco e il ciliegio.

All'inizio di gennaio le condizioni agrometeorologiche continueranno a essere determinate da temperature superiori alla norma e da valori medi giornalieri nelle regioni arabili superiori al minimo biologico necessario per il verificarsi di una vegetazione ritardata nelle colture cerealicole invernali.

Nella seconda metà della prima decade è prevista una diminuzione delle temperature e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Il raffreddamento previsto in questo periodo metterà fine alla tarda vegetazione delle colture cerealicole invernali e ostacolerà lo sviluppo intempestivo di alcune specie arboree, che altrimenti porterebbe a una riduzione della loro resistenza invernale. Durante la seconda e la terza decade le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine alle norme climatiche, che manterranno i cereali invernali in uno stato di dormienza.

A gennaio, le colture di frumento e orzo sverneranno in diversi stadi fenologici. I cereali invernali seminati tardivamente alla fine dell'autunno, nelle stazioni agrometeorologiche di Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven e Chirpan, si trovano nella fase di emergenza e nello stadio iniziale di formazione delle foglie. Nelle colture seminate a novembre a Kneža, Tărgoviște, Pazardžik, Haskovo e Ljubimec, predomina il terzo stadio fogliare. Una piccola parte delle colture di frumento e orzo in alcuni luoghi della Pianura Danubiana – la stazione agrometeorologica di Novachene – e nella Pianura dell'Alta Tracia nella regione di Plovdiv si trova nella fase di accestimento, che è la fase appropriata per lo svernamento. A gennaio le temperature minime previste, fino a meno 13°C, non rappresenteranno un rischio per le colture permanenti e per i cereali invernali che sono entrati nella fase di accestimento. In condizioni senza copertura nevosa, valori nell'intervallo di meno 10-13°C, se persistono per un periodo più lungo, saranno critici per le colture seminate tardivamente e poco sviluppate. Le precipitazioni previste a gennaio, intorno e sopra la norma, aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati di suolo di uno e due metri. Alla fine di dicembre, le riserve di umidità del suolo per il frumento nello strato di un metro nella maggior parte delle regioni arabili erano superiori all'85-90% della capacità di campo (CC).

Durante il mese, condizioni più adatte per eseguire la potatura invernale delle specie di frutta a pomo si verificheranno all'inizio della prima e durante la maggior parte dei giorni della terza decade.

Fonte: NIMH