

Temperature superiori alla norma all'inizio di marzo garantiranno un progresso attivo dei processi vegetativi nelle colture agricole.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.03.2024 *Брой:* 3/2024



Le temperature medie giornaliere superiori alla norma e i valori massimi insolitamente elevati registrati, attorno e sopra i 20°C, raggiungendo in alcune località 23°-24°C (Vidin, Montana, Knezha, Lovech, Veliko Tarnovo, Ruse, Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo, Elhovo, Sliven) a febbraio, hanno portato alla ripresa dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e a uno sviluppo prematuro e al rigonfiamento delle gemme nelle drupacee e in alcune pomacee – melo, stazioni agrometeorologiche Nikolaevo e Novachene. Le precipitazioni inferiori alla norma durante il mese non hanno permesso di raggiungere la piena saturazione nello strato di

suolo di un metro (capacità di campo) in alcune aree della Bulgaria centro-settentrionale e orientale e in località isolate della Pianura dell'Alta Tracia.

Durante i primi giorni della prima decade di marzo, sono previste temperature superiori alle norme climatiche e condizioni favorevoli al decorso della vegetazione nelle colture agricole. Entro la fine del periodo, è atteso un calo delle temperature fino a valori prossimi alle norme climatiche, vicini al minimo biologico necessario per il decorso dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali.

Durante il periodo, i processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali procederanno a ritmo rallentato con temperature medie giornaliere vicine alle norme climatiche per la prima decade del mese. In frumento e orzo, avrà luogo la fase di accestimento – inizio e accestimento completo. Nelle drupacee, si verificheranno le fasi di schiusura delle gemme, botton verde e inizio fioritura negli alberi più avanzati. Nelle pomacee, si osserverà il rigonfiamento delle gemme. Nella vite, si avrà il pianto – stazione agrometeorologica Bazovets. Durante il periodo, non sono previste temperature minime critiche per le drupacee sviluppatesi precocemente.

Le frequenti precipitazioni durante il periodo limiteranno le possibilità di eseguire le attività agrotecniche stagionali – esecuzione delle lavorazioni pre-semina sui terreni destinati alla semina del girasole, completamento della concimazione di copertura delle colture autunno-vernine con fertilizzanti azotati, completamento della potatura nei frutteti e vigneti, ed esecuzione dei trattamenti pre-fioritura negli alberi da frutto.

Durante la seconda e terza decade di marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo dinamico. Le temperature superiori alla norma previste garantiranno una progressione attiva dei processi vegetativi nelle colture agricole. Durante il mese, in frumento e orzo si osserverà la fase di accestimento, e nelle colture più avanzate della Pianura Danubiana, entro fine marzo si avrà l'inizio della levata. Nelle colture frutticole, si osserveranno diverse fasi, dal rigonfiamento e schiusura delle gemme al botton verde e inizio fioritura nelle drupacee a fioritura precoce – albicocco, pesco, ciliegio.

A marzo, le temperature minime previste fino a meno 5°C, a seconda della durata della loro persistenza, rappresenteranno un rischio per le colture frutticole avanzate nel loro sviluppo nelle fasi di formazione delle gemme e fioritura.

Le precipitazioni attese alla fine della prima, a metà della seconda decade e alla fine del mese aumenteranno le riserve di umidità del suolo nello strato di un metro.

Il tempo instabile previsto durante il mese limiterà le possibilità di eseguire le attività agrotecniche stagionali. Condizioni più adatte per effettuare i trattamenti fitosanitari pre-fioritura nei frutteti contro la monilia dei fiori (moniliosi precoce), la corineo, la bolla del pesco e la ticchiolatura delle pomacee si verificheranno nella prima metà della prima decade, all'inizio e alla fine della seconda decade. A marzo, iniziano i periodi agrotecnici ottimali per la semina del girasole – dal 15 marzo per la Bulgaria meridionale e dal 25 marzo per la Bulgaria settentrionale.

Fonte: NIMH