

Durante la terza decade di marzo – rischio di gelate

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 *Брой:* 3/2024



Alla fine della seconda e all'inizio della terza decade di marzo, in molte località delle aree di campo del paese si sono create le condizioni per la formazione di gelate, che hanno causato danni di varia entità alle fioriture degli alberi da frutto.

Durante il prossimo periodo di sette giorni le condizioni agrometeorologiche saranno nuovamente determinate da un tempo dinamico. Sono previste temperature medie giornaliere superiori al minimo biologico richiesto per il corso dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine. Nel frumento e nell'orzo procederà la fase di accestimento. Solo in località isolate delle regioni meridionali del paese si osserverà la fase di allungamento del culmo.

Secondo i dati dell'Istituto Agrario di Dobrugia (DAI) - General Toshevo, da ottobre 2023 alla fine di febbraio la quantità totale di precipitazioni è di 205 litri per mq. Tuttavia, durante i primi due mesi del 2024 sono caduti in totale 22 litri per mq. Contemporaneamente sono state registrate temperature elevate superiori a 16°C e in alcuni luoghi fino a 19,6°C. In queste condizioni il frumento di solito non entra in dormienza.

Negli ultimi anni, durante il mese di aprile, abbiamo assistito a fenomeni ormai comuni – bruschi cali di temperatura con basse temperature e gelate. Il freddo primaverile in combinazione con la siccità può avere un serio impatto sul frumento.

In singoli campi si osserva la presenza di septoriosi, ma è ancora troppo presto per il trattamento con fungicidi, ha riferito il Prof. Ivan Kiryakov, PhD del DAI ad Agri.bg. Alla fine di marzo una commissione formata dalla Direzione Regionale dell'Agricoltura ispezionerà i campi di frumento nella regione di Dobrich per determinare le condizioni delle colture, le loro fasi di sviluppo e eventuali problemi potenziali da affrontare nelle aree cerealicole.

Nelle colture permanenti si verificheranno varie fasi fenologiche – dal rigonfiamento delle gemme e dalla schiusura delle gemme alla gemma fiorale, alla fioritura e alla fogliazione. Durante i primi giorni del periodo sono previste gelate e temperature minime negative, che rappresenteranno un rischio per le colture frutticole più avanzate nel loro sviluppo.

Le precipitazioni previste nella seconda metà del periodo limiteranno le opportunità per i lavori di campo. Condizioni più adatte per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali – lavorazione del terreno pre-semina e semina del girasole, nonché trattamenti fitosanitari nelle colture agricole, saranno disponibili all'inizio del periodo. I trattamenti devono essere effettuati in condizioni di calma di vento e con velocità del vento fino a 2-3 m/s. Durante il periodo inizia la finestra temporale agrotecnica ottimale per la semina del girasole nella Bulgaria settentrionale.

Fonte: NIMH e Agri.bg