

Attività agrotecniche nel frutteto a maggio

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Durante la maggior parte dei giorni della prima decade di maggio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile con precipitazioni frequenti, che creeranno le condizioni per l'aumento del fondo infettivo delle malattie fungine. I processi vegetativi nelle colture agricole procederanno a ritmi moderati a temperature vicine alle norme climatiche.

Dopo il tempo instabile fino a metà mese, è previsto un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche nella seconda metà di maggio. Si prevede un aumento delle temperature medie giornaliere. Le precipitazioni sono attese alla fine di maggio. Per tutto il mese, rimane la possibilità di grandinate e il rischio di danni alle colture agricole.

Nei vivai di frutta

Nei vivai si controlla il corretto sviluppo delle gemme innestate. Se necessario, si eseguono nuovi polloni sui germogli nati dal portinnesto.

Se c'è il rischio di strozzature, si allentano i legami sui portinnesti re-innestati in primavera.

Semenzai, piante madri e vivai vengono coltivati. Se necessario, le piante nei semenzai vengono diradate.

Nelle piantagioni di frutta

Alla fine della fioritura, le arnie vengono spostate in un'altra posizione – ad almeno 5 km di distanza.



Nei nuovi frutteti di pesco con corona a vaso o a vaso migliorato, si esegue la potatura di formazione. Si presta attenzione al corretto radicamento e sviluppo degli alberi nei nuovi frutteti – zappatura, scacchiatura, irrigazione se necessario. Gli alberi nelle piantagioni giovani e dense vengono legati a una struttura a filo. Rami forti di due e tre anni vengono piegati e legati ai fili per ridurre il loro vigore di crescita. Nelle piantagioni giovani – di 2 e 3 anni – vengono rimossi alcuni degli allegamenti sul germoglio principale - ramo centrale. Continua il lavoro di diradamento dei frutti di pesco. Dopo il completamento finale della caduta dei frutti, le piantagioni vengono irrigate. La materia organica delle colture da sovescio viene interrata.

Il terreno viene mantenuto libero da erbacce e sciolto con una regolare lavorazione superficiale con un coltivatore o un erpice. Alla fine del mese, gli alberi da frutto vengono fertilizzati con 15-20 kg/dka di nitrato di ammonio o la stessa quantità di un altro fertilizzante azotato.

Continua la raccolta delle varietà precoci di ciliegie.

Nelle piantagioni di fragole



Continua la piantagione primaverile-estiva di piantine di fragola, conservate in frigorifero. Dopo la piantagione, viene applicata l'irrigazione a pioggia. Le aree piantate in aprile vengono diserbate. Nelle regioni più elevate, la paglia viene stesa sotto gli steli dei fiori entro la fine del mese.

La raccolta continua. Quando i frutti vengono trasportati su distanze maggiori, possono essere raccolti un po' prima. In caso di siccità durante la maturazione dei frutti, è necessario applicare l'irrigazione a pioggia o l'irrigazione a gravità.

Nelle piantagioni di lamponi

Si effettua una regolare lavorazione del terreno. I germogli di alcune varietà vengono legati alla struttura di supporto, mentre per altre varietà si fa attenzione a impedire che si affloscino tra le file.



Durante la fioritura, è consigliabile fornire due colonie di api per 10 dka.

Nelle piantagioni di ribes nero



Continua la cura – coltivazione e irrigazione per le zone di radicazione. I germogli radicali deboli e superflui vengono rimossi. In caso di siccità, viene eseguita un'abbondante irrigazione. Inizia il lavoro di organizzazione della raccolta dei frutti di ribes nero.

Nelle piantagioni con altre colture

I portainnesti di limone vengono innestati a gemma. L'innesto del cachi continua. La superficie del terreno viene mantenuta libera da erbacce e regolarmente allentata con una lavorazione superficiale. Viene garantita un'irrigazione frequente e regolare fino al secondo periodo di dieci giorni.



Continua la piantagione di *Actinidia chinensis* in campo aperto. Dopo la piantagione, viene annaffiata. Le viti di Actinidia vengono regolarmente legate a rami di supporto ausiliari. Il fusto non deve avvolgersi attorno al ramo di supporto e i germogli laterali su di esso vengono rimossi. Vengono fornite tre colonie di api per 10 dka di Actinidia.