


Nella terza decade di maggio, per i cereali invernali ben forniti di umidità, avverrà la formazione e il riempimento della granella.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 23.05.2024 *Брой:* 5/2024



Dopo il tempo fresco per la stagione a metà maggio, durante il terzo decennio del mese, è previsto un aumento significativo delle temperature, la normalizzazione delle condizioni termiche e l'attivazione dei processi vegetativi nelle colture agricole.

Le precipitazioni previste alla fine del secondo e all'inizio del terzo decennio nella maggior parte delle regioni agricole manterranno le riserve di umidità del suolo entro limiti ottimali nello strato di 50 e 100 cm - oltre l'85% di FC. Durante il periodo, per le colture di cereali invernali ben rifornite di umidità, si verificherà la formazione e il

riempimento della granella. Nelle regioni sud-orientali (agro-stazione di Karnobat), per l'orzo, prima del solito, si osserverà anche la fase di maturazione lattea.

La formazione delle foglie si verificherà nel mais e nel girasole. Alla fine del periodo, per il girasole seminato nel periodo agrotecnico, si osserverà anche l'inizio della formazione dell'infiorescenza.

Il tempo instabile previsto con frequenti precipitazioni durante il prossimo periodo manterrà un elevato background infettivo da patogeni fungini: marciume bruno tardivo sui frutti in maturazione delle varietà precoci di ciliegio, muffa grigia sulle fragole, peronospora su viti e ortaggi, ticchiolatura su specie di pomacee, ecc.



Mosca delle ciliegie

Durante il terzo decennio di maggio, la mosca delle ciliegie causa danni alle varietà medio-precoci di ciliegio. Per limitare i danni da questo parassita, si raccomanda un trattamento all'inizio della fase di maturazione del frutto (quando i frutti di ciliegio iniziano a rosarsi leggermente) con un insetticida a breve periodo di carenza.

Nei vigneti, si dovrebbero continuare le indagini per la presenza e l'attività dannosa delle larve di prima generazione della tignoletta della vite, e nelle colture frutticole – per la carpocapsa del melo, la tignola del susino e la tignola orientale del pesco.

Durante il periodo, l'aumento del contenuto di umidità negli strati superiori del suolo limiterà le lavorazioni stagionali del terreno e la lotta contro la vegetazione infestante competitiva.

Fonte NIMH