

Ai primi di giugno – con una favorevole combinazione di calore e umidità, la vegetazione delle colture primaverili procederà.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.06.2024 Брой: 6/2024



Durante la prima settimana di giugno, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo accelerato in condizioni termiche superiori alla norma e con ottime riserve di umidità nel suolo - a causa delle significative precipitazioni di maggio, che hanno superato le norme mensili nella maggior parte del paese, ad eccezione di alcune aree nelle regioni estreme nord-orientali e sud-occidentali.

Durante il periodo, l'ingrossamento della granella si verificherà nei cereali invernali nei campi più elevati. Nelle regioni di pianura, il grano attraverserà le seguenti fasi: maturazione lattea, transizione alla cerosa e

maturazione cerosa per le colture nelle regioni sud-orientali. Per l'orzo nelle regioni meridionali, prevarrà la maturazione cerosa.

All'inizio di giugno, con una combinazione favorevole di calore e umidità, la vegetazione delle colture primaverili procederà. La formazione delle foglie sarà osservata nel mais e nel girasole. Per le colture di girasole seminate entro il periodo agrotecnico (Plovdiv, Haskovo, Lyubimets), si verificherà la formazione dell'infiorescenza.

Le precipitazioni previste durante il periodo manterranno condizioni adatte allo sviluppo di malattie fungine: peronospora sulle colture orticole; marciume bruno tardivo, ticchiolatura e oidio sugli alberi da frutto; peronospora e oidio sulle viti, il che richiede una tempestiva protezione fitosanitaria dopo la cessazione delle piogge.

Per gli ultimi giorni del periodo sono previste una maggiore probabilità di grandinate e un rischio di allettamento delle colture e di danni al raccolto di cereali in piedi.

Fonte NIMH