


Giugno – da tempo instabile con precipitazioni a condizioni di caldo sopra la norma

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024*



A giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile con precipitazioni, intorno e al di sopra della norma mensile, che manterranno buone e ottime riserve di umidità nello strato di terreno di 50 cm e 100 cm – oltre il 75-80% della CC (Capacità di Campo). Livelli inferiori di riserve di umidità del suolo sono previsti in alcune località nelle regioni estremamente nord-orientali e sud-occidentali (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), dove le precipitazioni di maggio sono state al di sotto della norma mensile.

All'inizio di giugno, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo accelerato, in condizioni termiche superiori alla norma. A causa delle alte temperature durante la vegetazione primaverile di grano e orzo, completeranno il loro sviluppo prima del solito. Durante i primi dieci giorni di giugno, si osserverà la maturazione

cerosa di massa per l'orzo nelle aree di campo, e alla fine del periodo di dieci giorni - la piena maturazione. Per il grano durante questo periodo, si verificheranno la maturazione lattea, la transizione alla maturazione cerosa e la maturazione cerosa.

Durante la maggior parte dei giorni del secondo decennio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine alla norma per il periodo. A metà del decennio, le colture cerealicole invernali nei campi elevati entreranno nella fase di maturazione. Per il mais, si verificherà la formazione delle foglie, e per i girasoli, prevarrà la formazione dell'infiorescenza.

Per la maggior parte del periodo dal 7 al 13 giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo caldo con probabilità di precipitazioni locali e grandine. Le temperature massime supereranno i 30°C per tutto il periodo, raggiungendo i 38°C nella Piana della Tracia, il che è un prerequisito per lo stress da calore e il deterioramento delle condizioni per il normale sviluppo delle piante coltivate nei loro stadi vegetativi e generativi.

All'inizio del secondo decennio di giugno, si verificherà la formazione delle foglie per il mais; per i girasoli seminati entro i tempi agricoli ottimali - la formazione dell'infiorescenza; per le colture leguminose (fagioli, soia) - la germinazione e la fioritura. Per l'orzo nelle aree di campo, prevarrà la maturazione cerosa. Per il grano, si verificherà la maturazione lattea e cerosa di massa. Per la colza, si osserverà la fase di maturazione.

Le previste condizioni termiche superiori alla norma durante il terzo decennio di giugno accelereranno la vegetazione delle colture primaverili, e alcune di esse entreranno nelle fasi riproduttive del loro sviluppo. Per le colture di girasole seminate entro i tempi agricoli ottimali, si osserverà l'inizio della fase di fioritura, e per gli ibridi di mais più precoci - la spigatura e il rilascio del polline. Durante questo periodo, sono previste temperature massime fino a 35-36°C, che influenzeranno negativamente la fioritura e la fertilizzazione nelle colture orticole.

A giugno, le previste frequenti precipitazioni sono un prerequisito per lo sviluppo di malattie fungine: marciume bruno tardivo, ticchiolatura e oidio sugli alberi da frutto; peronospora sulle colture orticole; peronospora, oidio e muffa grigia sulle viti. Condizioni più adatte per effettuare irrorazioni fitosanitarie saranno create durante la seconda metà del mese.

! Le alte temperature e la bassa umidità atmosferica limiteranno le possibilità di effettuare misure di protezione delle piante e renderanno difficile il lavoro sul campo.

