

Luglio – clima secco e caldo, che porterà a un accorciamento dei periodi interfase nelle colture agricole

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.07.2024 Брой: 7/2024



Nella prima metà della prima decade del mese, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile. Le precipitazioni previste in molte località delle aree di campo del paese miglioreranno temporaneamente le condizioni per il corso dei processi vegetativi nelle colture primaverili.

Durante la maggior parte dei giorni della seconda e terza decade di luglio, è previsto un tempo relativamente secco e caldo, che porterà a un accorciamento dei periodi interfase. Un fattore limitante per lo sviluppo del mais

e del girasole sarà il deficit di umidità del suolo. Nel mais si osserveranno varie fasi – emissione delle pannocchie, fioritura della pannocchia ed emissione delle setole. Alla fine del mese, si osserverà l'inizio della maturazione lattea negli ibridi di mais precoci. Nel girasole avverranno la fioritura, la fecondazione e il riempimento dei semi. I valori massimi di temperatura previsti tra 35-40°C avranno un impatto negativo sulle colture durante la fase riproduttiva.



Le alte temperature previste a luglio e il tempo relativamente secco limiteranno lo sviluppo di malattie fungine nelle colture agricole, ad eccezione degli *oidi* nelle colture perenni e nelle colture orticole. Le precipitazioni previste attorno e al di sotto della norma mensile richiederanno l'applicazione di un regime di irrigazione aumentato.



Condizioni più adatte per eseguire trattamenti fitosanitari (contro la seconda generazione di vermi della frutta nei frutteti, contro l'acariose gialla della vite nei vigneti) si verificheranno nella seconda metà della prima decade, durante la maggior parte dei giorni della seconda decade e alla fine del mese. I trattamenti dovrebbero essere effettuati durante le ore più fresche della giornata.

Nelle regioni occidentali del paese, rimane elevata la probabilità di fenomeni locali intensi e di grandinate e del verificarsi di danni alle colture agricole – allettamento delle colture cerealicole e sgretolamento della granella, lesioni meccaniche alle colture primaverili e alla produzione ortofrutticola. La raccolta del grano in gran parte delle aree di campo del paese avverrà in condizioni di aumentato rischio di incendi.

Fonte: NIMH