

Settembre – le condizioni consentiranno la formazione di un raccolto aggiuntivo dalle colture orticole tardive

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Durante la maggior parte dei giorni della prima decade di settembre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alle norme climatiche, il che accelererà il completamento delle fasi finali di sviluppo delle colture di campo tardive. Negli ibridi di mais tardivo, si osserveranno gli stadi di maturazione cerosa e di piena maturità. Nella prima metà del periodo, nelle regioni orientali è prevista una maggiore probabilità di precipitazioni, nonché un miglioramento dell'umidità del suolo negli strati superiori e delle condizioni per eseguire le lavorazioni pre-semina. Nella restante parte delle aree coltivate del paese, le condizioni permetteranno la liberazione dei terreni dalle colture mature di girasole e mais.

Durante la seconda decade del mese, è previsto un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Per la maggior parte dei giorni del periodo, è prevista una relativa diminuzione delle temperature, insieme a condizioni per precipitazioni in più località delle regioni coltivate. Le precipitazioni attese, a seguito della siccità intensificatasi alla fine dell'estate, miglioreranno le condizioni degli strati superficiali del suolo e le condizioni per una lavorazione pre-semina e una semina della colza invernale di qualità superiore. Il periodo agrotecnico ottimale per la semina della colza è fino alla fine della seconda decade di settembre.

Le precipitazioni previste durante la seconda e la prima metà della terza decade aumenteranno il rischio di sviluppo di patogeni fungini nella produzione di frutta e verdura in maturazione: muffa grigia sull'uva, marciume bruno tardivo sui frutti delle varietà tardive di alberi da frutto, peronosspore sulle colture orticole.



Nottua del cotone

A settembre, per le colture orticole da produzione di campo tardiva, non si deve sottovalutare il trattamento fitosanitario contro i bruchi della terza generazione della nottua del cotone, poiché causano danni e deteriorano la qualità del raccolto orticolo.

Nella seconda metà della terza decade, sono attese tempo secco e condizioni favorevoli per la raccolta della coltura di uva matura.

A settembre, non sono previste temperature minime critiche e le condizioni permetteranno la formazione di produzione aggiuntiva da colture orticole tardive.

Fonte: NIMH