

Semina ritardata del colza invernale e condizioni per le infezioni e lo sviluppo di patogeni nelle colture agricole tardive

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



Dopo la prolungata siccità, all'inizio di settembre si sono verificate in molte parti del paese (Silistra, Varna, Dobrich, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski) precipitazioni economicamente significative, superiori a 30–40 l/m².

Queste precipitazioni sono arrivate in ritardo persino per le colture tardive, che, a causa del deficit di umidità del suolo e delle temperature estive superiori alla norma, hanno completato il loro sviluppo molto prima dei limiti temporali consueti.

Anche durante la settimana corrente, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile. Nel periodo sono previste precipitazioni, che miglioreranno le riserve di umidità negli strati superficiali del suolo e le condizioni per eseguire le lavorazioni stagionali del terreno.

A causa della siccità, è stata rinviata la lavorazione pre-semina delle aree destinate alla semina della colza invernale, una coltura che richiede una preparazione precisa del terreno. Per questo motivo, in molte parti del paese la semina della colza sarà effettuata dopo le scadenze agrotecniche ottimali. Queste scadono alla fine della seconda decade di settembre.

Nella maggior parte dei giorni del periodo, il previsto clima fresco con frequenti precipitazioni creerà condizioni favorevoli a infezioni e allo sviluppo di patogeni nelle colture agricole tardive: ticchiolatura tardiva sugli alberi da frutto, muffa grigia sull'uva, peronospora sulle colture orticole.



Durante la seconda decade di settembre, nei cavoli coltivati per la produzione autunnale, è necessario monitorare i parassiti: i bruchi della cavolaia, della tignola del cavolo, della tignola delle crucifere, e quando la loro densità supera la soglia economica di danno (3–5 bruchi per pianta), è necessario un trattamento con insetticidi a breve intervallo pre-raccolta.

Il prossimo periodo è adatto per la semina di spinaci e altre verdure a foglia per la produzione autunnale.

Fonte: NIMH