

Ottobre – precipitazioni di importanza agronomica e buone condizioni per lo sviluppo della colza invernale

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



In ottobre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature attorno e sopra le norme climatiche e da precipitazioni vicine alle medie mensili. Dopo la siccità estiva, le piogge economicamente significative di settembre, in alcune aree della Bulgaria orientale e in località di quella occidentale, hanno migliorato il contenuto di umidità degli strati superficiali del suolo e le condizioni per eseguire le lavorazioni stagionali del terreno.

Le precipitazioni di fine settembre sono state distribuite in modo non uniforme. In molte località della Bulgaria centrale e nord-orientale, sono state registrate precipitazioni fino a e oltre i 30-35 l/m² (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrich - 53 l/m²), il che ha portato a un sostanziale miglioramento delle riserve di umidità negli strati superficiali del suolo e delle condizioni per condurre le lavorazioni stagionali del terreno. A differenza delle regioni centrali e orientali, in parti della Bulgaria occidentale e meridionale le piogge all'inizio dell'autunno non hanno avuto significato economico. In queste parti del paese, il terreno secco e compatto ostacola seriamente l'aratura profonda e la preparazione pre-semina delle aree destinate alla semina delle colture invernali.

Durante la maggior parte dei giorni della prima decade di ottobre, non sono previste precipitazioni significative e le condizioni permetteranno la preparazione dei campi e la loro semina con colture cerealicole invernali. La siccità estiva ha impedito la semina tempestiva della colza invernale e, in alcune zone delle regioni arabili della Bulgaria centrale, le aree verranno seminate al di fuori del periodo agrotecnico. È altamente probabile che le colture seminate in ritardo non raggiungano lo stadio di rosetta durante la vegetazione autunnale, il che garantisce il successo dello svernamento della coltura senza danni.

In ottobre si svolgono i periodi agrotecnici ottimali per la semina delle colture cerealicole invernali. Il periodo per la Bulgaria settentrionale è durante la prima metà del mese, per la Bulgaria meridionale durante la seconda metà del mese, e per le regioni del Mar Nero durante la terza decade. Le precipitazioni attese alla fine della prima e all'inizio della seconda decade, così come durante la seconda metà della terza decade del mese, saranno di notevole importanza per il normale svolgimento delle fasi iniziali della vegetazione del frumento e dell'orzo. In ottobre, a seconda delle date di semina, si osserveranno nel frumento le seguenti fasi: emergenza, prima e terza foglia.



Il clima caldo previsto nella seconda metà del mese sarà un presupposto per un aumento della popolazione dell'arvicola comune. I campi con colture seminate in autunno devono essere monitorati e, quando viene raggiunta la soglia economica di danno – SED: 2 colonie attive/da – dovrebbero essere trattati.

Condizioni per i lavori di campo esisteranno a metà della seconda e durante la prima metà della terza decade, quando è previsto un tempo relativamente secco.



In ottobre, nei frutteti di mele e pere colpiti dalla ticchiolatura, al fine di ridurre l'infezione, è consigliabile all'inizio della caduta delle foglie, dopo la raccolta dei frutti, effettuare un trattamento con una soluzione di urea al 5%.

Per le specie a drupacea, dopo la caduta massiva delle foglie, si raccomanda un trattamento con poltiglia bordolese al 2% contro gli agenti causali della corineo, della monilia precoce e della bolla del pesco.

All'inizio di ottobre sono previste gelate al suolo, che limiteranno le possibilità di produzione aggiuntiva da ortaggi tardivi sensibili ai danni da gelo.

Fonte: NIMH