

Le precipitazioni distribuite in modo non uniforme nel paese portano a differenze nello stato fenologico delle colture cerealicole invernali.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



Fino alla fine della seconda e all'inizio della terza decade di novembre, saranno determinate da temperature medie giornaliere superiori alle norme climatiche e al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali.

Nel periodo non sono attese precipitazioni significative e variazioni nei livelli delle riserve idriche autunnali del suolo. Le precipitazioni cadute nel periodo passato si sono distribuite in modo disomogeneo. In molte località delle regioni nordoccidentali, nell'Alta Pianura Tracia e nelle parti più meridionali del paese, sono state registrate

precipitazioni inferiori a 10-12 l/m² – del tutto insufficienti per colmare il deficit idrico nelle colture cerealicole invernali.

In alcune delle regioni orientali (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) si sono verificate precipitazioni significative – superiori a 25-30 l/m². In queste regioni si è verificato un miglioramento delle riserve idriche del suolo negli strati superiori e delle condizioni per la vegetazione delle colture seminate in autunno.

Mentre nel paese ottobre e l'inizio di novembre sono stati periodi di siccità e mancanza di precipitazioni agricolamente efficaci, nella regione di Dobrich si osservano sufficienti riserve idriche del suolo, che contribuiscono al buon sviluppo delle colture di frumento. Le temperature consentono una normale emergenza dove l'umidità è sufficiente. Le temperature più basse in Dobrugia proteggono le colture seminate in autunno dagli attacchi dei parassiti, come le mosche dei cereali e gli afidi.

Nel periodo si osserveranno diversi stadi nel frumento – germinazione, emergenza (stazioni agrometeorologiche: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) e formazione della 1a–2a e 3a foglia (Novachene). Le differenze nelle condizioni fenologiche delle colture cerealicole invernali sono una conseguenza della prolungata siccità autunnale e della semina ritardata.

Nel periodo, le condizioni saranno adatte per la piantumazione di alberi da frutto e per lo svolgimento di attività fitosanitarie nelle colture frutticole.

Fonte: NIMH