

All'inizio di dicembre, le precipitazioni previste aumenteranno le riserve di umidità negli strati superiori del suolo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Nel corso del prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento sostanziale. Nella Bulgaria occidentale è prevista una significativa diminuzione delle temperature, ma senza valori minimi critici per le colture autunnali che sono in ritardo nel loro sviluppo. L'ondata di freddo all'inizio di dicembre porterà a un rallentamento e, nei campi più alti, dove è prevista la formazione di una copertura nevosa, a una cessazione dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali.

Nella maggior parte delle regioni orientali e meridionali, le temperature medie giornaliere previste saranno vicine al minimo biologico richiesto per lo sviluppo delle colture cerealicole invernali. Condizioni favorevoli alla vegetazione nelle colture autunnali si svilupperanno nelle regioni lungo la costa del Mar Nero, dove sono previste temperature più elevate.

Le precipitazioni previste nel periodo aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati superiori del terreno. Queste precipitazioni saranno tardive per parte delle colture in alcuni luoghi delle regioni centrali e meridionali, dove, a causa di un deficit di umidità del suolo, le colture cerealicole invernali germogliate non sono riuscite ad emergere. Come risultato della prolungata siccità autunnale, gran parte delle colture cerealicole invernali sono poco affrancate, in una fase iniziale di sviluppo, e le parcelle presentano una densità disomogenea. All'inizio di dicembre, nelle colture di grano verranno osservate le seguenti fasi: emergenza, 1-2 e 3 foglie. Una piccola parte delle parcelle nelle regioni nordorientali, dove l'umidità nella prima metà dell'autunno non è stata un fattore limitante, si trova nella fase di accestimento (la regione di Provadia) – la fase appropriata per lo svernamento.

Durante il periodo, si verificheranno condizioni più favorevoli per la piantumazione di alberi da frutto nelle regioni orientali del paese.

Fonte NIMH