

Dicembre – temperature vicine alle norme climatiche e precipitazioni di rilevanza agricola

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



All'inizio di dicembre è prevista una sostanziale diminuzione delle temperature, che porterà a un rallentamento e alla cessazione della vegetazione nelle colture autunno-vernine nella maggior parte delle regioni arabili del paese.

Nella Bulgaria orientale, dove i valori massimi raggiungeranno i 15-16°C, si creeranno le condizioni per una breve attivazione della vegetazione nelle colture autunno-vernine, ma non è atteso un cambiamento significativo nello stato fenologico delle colture cerealicole invernali.

All'inizio del mese, a causa della prolungata siccità autunnale, gran parte delle colture di frumento cesserà la propria vegetazione in uno stato sottosviluppato, in una fase iniziale di crescita. Nelle colture cerealicole invernali predominano le fasi di emergenza e formazione fogliare iniziale (1-2 foglie), il che solleva dubbi riguardo al loro svernamento riuscito. Una piccola parte delle colture nelle regioni nordorientali (Targovishte, Silistra, Provadia), dove l'umidità nella prima metà dell'autunno non è stata un fattore limitante, si trova nella fase della terza foglia e all'inizio dell'accestimento (la regione di Provadia) – la fase appropriata per lo svernamento.

Entro la fine della prima e durante la maggior parte dei giorni della seconda e terza decade, le temperature previste, vicine alle norme climatiche, manterranno le colture agricole in svernamento in dormienza. Durante il mese, sono previste temperature minime fino a meno 10°C che, in assenza di copertura nevosa e con una persistenza più prolungata, saranno critiche per le colture cerealicole invernali sottosviluppate nelle fasi di emergenza e formazione fogliare iniziale.

Le precipitazioni previste a dicembre, intorno alla norma mensile, aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati di 50 e 100 cm.

Le precipitazioni cadute all'inizio di dicembre hanno superato i 30-40 l/m² in molti luoghi della Bulgaria centrale e meridionale (Lovech - 33 l/m², Blagoevgrad - 41 l/m², Sandanski - 42 l/m², Plovdiv - 42 l/m², Haskovo - 41 l/m², Kardzhali - 50 l/m², Chirpan - 39 l/m²), il che ha portato a superare il deficit idrico per le colture autunno-vernine negli strati superficiali del suolo. Nel periodo successivo, sono attese ulteriori precipitazioni agronomicamente significative, nonché un aumento del livello delle riserve di umidità del suolo negli strati di 50 cm e 100 cm.

Fonte: Istituto Nazionale di Meteorologia e Idrologia (NIMH)