

All'inizio di febbraio, le colture autunnali sono in buone condizioni.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025*



Le temperature insolitamente elevate durante l'ultima settimana di gennaio, che hanno raggiunto i 17-18°C in molte parti del paese, e in alcune regioni della Bulgaria settentrionale – fino a e oltre i 20°C (Vratsa - 22°C, Pleven - 22°C, Lovech - 22°C, Veliko Tarnovo - 23°C, Silistra - 20°C), hanno portato alla ripresa dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno in parte delle aree coltivate del paese. Le temperature di gennaio sopra la norma hanno anche interrotto la dormienza in alcune specie arboree.

Le colture seminate in autunno in Dobrugia sono in buone condizioni generali, riferisce il Prof. Dott. Ivan Kiryakov, Capo del Dipartimento "Miglioramento Genetico delle Colture Cerealicole e Leguminose da Granella" presso l'Istituto Agricolo di Dobrugia – General Toshevo. Il frumento, a seconda della data di semina, si trova in

diverse fasi del suo sviluppo - alcune colture stanno uscendo dall'accestimento, altre sono all'inizio della fase. Il suo consiglio è di posticipare la concimazione alla seconda metà di febbraio.

Anche le colture nella Bulgaria meridionale si stanno sviluppando normalmente e sono nella fase di accestimento. Non sono stati osservati danni da malattie, parassiti o da freddo invernale al frumento, ci ha riferito il Prof. Associato Dott. Evgeniy Dimitrov dell'Istituto di Risorse Genetiche Vegetali "K. Malkov" di Sadovo. Lì, la concimazione azotata del frumento di solito inizia all'inizio di febbraio.

Un fattore limitante per lo sviluppo delle colture in tutto il paese è l'umidità nello strato del suolo, che nelle condizioni delle regioni meridionali del paese negli ultimi anni è stata caratterizzata da livelli molto bassi, ben al di sotto della norma.

Dopo il clima insolitamente caldo, entro la fine della settimana le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento, che sarà sostanziale nella seconda metà del periodo. L'ondata di freddo prevista fermerà la vegetazione prematura delle colture cerealicole invernali e frenerà l'indesiderato sviluppo iniziale degli alberi da frutto.

Durante il periodo, non sono previste temperature minime critiche per il superamento dell'inverno delle colture agricole.

Condizioni più adatte per eseguire le lavorazioni del suolo e la potatura nei vigneti e nei frutteti si verificheranno all'inizio del periodo.

foto© bluedesign - Fotolia.com

Fonte: NIMH e Agri.bg