

All'inizio di marzo, le precipitazioni e le nevicate aumenteranno il livello delle riserve di umidità del suolo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Le basse temperature minime registrate nel corso degli ultimi sette giorni, in alcune zone della Bulgaria nord-occidentale e negli altopiani vallivi fino a e sotto i meno 13-14°C a Vidin, Kneja, Dragoman e Kazanlak, hanno messo a dura prova la resistenza al freddo delle colture autunnali sottosviluppate in assenza di copertura nevosa. Valori di questo ordine, se mantenuti per un periodo prolungato, sono critici per il superamento dell'inverno dei cereali invernali allo stadio di 2-3 foglie.

Nelle regioni nord-occidentali, sono imminenti ispezioni in campo delle colture presso le stazioni agrometeorologiche di Băzovec, Kneja, Kyustendil e Kazanlak per valutare possibili danni da gelo.

Le temperature estremamente basse dell'ultima settimana di febbraio hanno avuto un effetto devastante sui frutteti nella regione di Ruse-Silistra. In alcune località le temperature sono scese fino a meno 24 gradi, con il risultato che una grande proporzione delle gemme a frutto degli albicocchi si è congelata, riferisce Nikolay Kolev – Presidente dell'Unione dei Frutticoltori del Danubio – Ruse. Danni da gelo si osservano anche su ciliegio, pesco, susino, melo e pero.

Alla fine di febbraio e all'inizio di marzo, le temperature saranno al di sotto delle norme climatiche, il che manterrà lo stato di dormienza nelle colture seminate in autunno. I valori minimi previsti sono superiori alle soglie critiche per le colture agricole in fase di svernamento.

Le precipitazioni attese di pioggia e neve aumenteranno il livello delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm. A causa delle precipitazioni inferiori alla norma di gennaio e della prima metà di febbraio, le riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm nella maggior parte del paese sono insoddisfacenti per questo periodo dell'anno. È prevista una maggiore probabilità di formazione di copertura nevosa e un miglioramento delle condizioni di svernamento per le colture seminate in autunno alla fine della prossima settimana.

Fonte: NIMH