

Aprile – tempo instabile e precipitazioni di rilevanza agricola

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 *Брой:* 4/2025



Ad aprile, le condizioni agrometeorologiche saranno caratterizzate da una maggiore dinamicità. Per la maggior parte dei giorni del mese, saranno determinate da tempo instabile. Le precipitazioni previste, intorno e sopra le norme climatiche, manterranno buone riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e condizioni favorevoli per la vegetazione dei cereali invernali e delle colture primaverili seminate. Questo è quanto affermato nella previsione mensile degli agrometeorologi del NIMH.

Nella prima metà di aprile, la vegetazione delle colture agricole procederà con temperature medie giornaliere intorno e al di sotto delle norme climatiche. Nella prima decade, il frumento nelle aree di campo entrerà nella fase di allungamento del culmo.

Nella seconda decade, sono previste temperature minime negative fino a meno 2-3°C, con un rischio maggiore di danni alle fioriture e agli allegati giovani degli alberi da frutto. Le ultime gelate primaverili sono attese alla fine del periodo decadale, aspetto da tenere in considerazione durante l'indurimento delle piantine di ortaggi.

Malattie da Septoria nel frumento invernale

Un aumento delle temperature medie giornaliere e un'accelerazione dei tassi di sviluppo delle colture agricole sono previsti alla fine della seconda e durante la terza decade. In questo periodo, il frumento subirà una transizione dall'allungamento del culmo alla levata e alla fase di spigatura. Il periodo inter-fase allungamento del culmo – spigatura è critico per l'infezione dei cereali invernali con la septoriosi fogliare.



Le coltivazioni di frumento dovrebbero essere monitorate anche per la presenza di parassiti – la criocera dei cereali, la cimice dei cereali e, a densità superiori alla soglia economica di danno, è necessario un trattamento tempestivo.



Ticchiolatura del melo

Le frequenti precipitazioni durante il mese creeranno le condizioni per un aumento del potenziale d'infezione di numerose malattie fungine nelle colture frutticole – monilia dei fiori (marrume bruno precoce), ticchiolatura, corineo, bolla del pesco, ecc. Nella prima metà della terza decade, è prevista una maggiore probabilità di temporali con grandine. Gli alberi da frutto colpiti dalla grandine dovrebbero essere trattati con fungicidi a base di rame alla prima opportunità, al fine di limitare il rischio di infezioni secondarie da parte di patogeni.

Ad aprile, condizioni più adatte per eseguire i trattamenti fitosanitari si verificheranno all'inizio e alla fine della seconda decade e durante la seconda metà della terza decade.

All'inizio della terza decade, la temperatura del suolo nello strato di 10 cm raggiungerà valori adatti per la semina del mais, e alla fine di aprile – anche per le colture primaverili termofile (cotone, fagioli, arachidi, angurie, meloni, ecc.).