

Controllo rapido delle infestanti per alte rese di girasole

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Gli erbicidi di FMC Agro Bulgaria – Express® 50 SG ed Evorelle® Express® – forniscono protezione selettiva e campi puliti nelle prime fasi di crescita del girasole.

Gli erbicidi Express® 50 SG e Evorelle® Express® sono destinati al controllo selettivo delle malerbe a foglia larga in **ibridi di girasole tolleranti a Express® ed Evorelle® Express®**. È estremamente importante che gli erbicidi vengano **applicati solo su ibridi tolleranti**, con l'elenco disponibile sul sito web FMC. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i rappresentanti di vendita FMC.

Express® 50 SG e Evorelle® Express® sono gli unici erbicidi registrati per l'uso in un gran numero di ibridi di girasole tolleranti a Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

Express® 50 SG – efficacia comprovata contro le principali malerbe a foglia larga nel girasole

Express® 50 SG è un erbicida sistemico post-emergenza che fornisce un controllo affidabile delle malerbe a foglia larga più diffuse e di difficile controllo nel girasole come **il cardo strisciante, il convolvolo, l'amaranto, lo stramonio, il farinello comune, la quinoa selvatica** e altre. La crescita delle infestanti si arresta poche ore dopo il trattamento e la morte completa avviene entro 15-25 giorni.

Per garantire la piena efficacia del prodotto, l'adiuvante Trend® 90 deve essere aggiunto alla soluzione di spruzzatura. Non è raccomandato il trattamento di piante sotto stress.

Evorelle® Express® – una nuova soluzione per sfide serie

Evorelle® Express® è un erbicida ad azione combinata, destinato al controllo efficace delle malerbe a foglia larga resistenti nel girasole. Evorelle® Express® è particolarmente adatto in condizioni in cui vi è una diffusione di malerbe di difficile controllo come **l'apocino canapino, il cardo strisciante, lo stramonio, il farinello comune, il sorgo d'Aleppo** e varie **specie di quinoa selvatica**. Il prodotto penetra rapidamente nei tessuti delle infestanti, bloccando i processi enzimatici associati alla crescita. I sintomi visibili compaiono entro dieci giorni dal trattamento e la morte delle specie sensibili avviene entro 15–25 giorni.

Il controllo delle infestanti crea un ambiente favorevole, ma la crescita richiede anche una nutrizione bilanciata. I fertilizzanti fogliari e i biostimolanti FMC – **Rhizomagic, Seamac™ OR, Nuvola™ AMIN e BO-LA™** – forniscono alle piante i nutrienti necessari, gli aminoacidi e i composti bioattivi che supportano la crescita, aumentano la tolleranza e compensano le condizioni di stress. Alcuni di essi, tra cui Rhizomagic, Seamac™ OR e Nuvola™ AMIN, sono inclusi nell'elenco dell'Agenzia Bulgara per la Sicurezza Alimentare (BFSA) dei fertilizzanti organici e organo-minerali registrati e sono **adatti all'uso negli eco-schemi**.