

Alla fine di aprile – tempo instabile con precipitazioni e condizioni per la formazione di gelate

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Alla fine di aprile, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature vicine alle norme climatiche per la terza decade di aprile. Le precipitazioni alla fine del periodo passato in molti luoghi delle regioni occidentali hanno aumentato le riserve di umidità negli strati superiori del suolo. Nei primi giorni del periodo sono previste precipitazioni e un miglioramento delle condizioni per la vegetazione delle colture agricole anche nelle regioni orientali del paese.

Lo sviluppo delle colture cerealicole invernali e delle colture primaverili seminate nella seconda metà del periodo procederà in condizioni termiche inferiori alla norma. Alla fine di aprile, lo stadio di levata prevarrà massicciamente nel grano. All'inizio di maggio, nell'orzo in alcuni luoghi delle regioni di campo, si osserverà anche l'inizio della spigatura. Nelle colture seminate di girasole e mais, a seconda delle date di semina, avverranno l'emergenza e la formazione iniziale delle foglie.

Parassiti del mais



Punteruolo grigio del mais (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

Nelle fasi iniziali della vegetazione del mais e del girasole, le colture dovrebbero essere monitorate per la presenza di un parassita pericoloso: il punteruolo grigio del mais. Quando la densità del parassita supera la Soglia Economica di Danno (EIL), le colture devono essere trattate alla prima opportunità con uno degli insetticidi registrati (EIL allo stadio di emergenza: girasole – 2 coleotteri per m²; mais > 2 coleotteri per m²).



Peronospora della vite (Plasmopara viticola)

Nella vite, avverrà la formazione della 2a-3a foglia, e nelle regioni estreme meridionali la comparsa delle infiorescenze. Durante questo periodo, è consigliabile effettuare trattamenti preventivi alle viti contro gli agenti causali della peronospora e dell'oidio.

Pratiche di difesa delle piante nelle colture orticole in aprile

Alla fine di aprile, è prevista una sostanziale diminuzione delle temperature minime e condizioni per la formazione di gelate, che dovrebbero essere prese in considerazione durante il trapianto delle piantine di ortaggi negli orti.