

Nell'ultima settimana di maggio, lo sviluppo delle colture agricole procederà con temperature al di sotto delle norme climatiche e precipitazioni utili all'agricoltura.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025*



Nel corso del prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche continueranno a essere determinate da tempo instabile. Nel periodo sono previste precipitazioni di rilevanza agronomica, nonché un miglioramento delle riserve di umidità del suolo anche negli strati più profondi.

Le precipitazioni durante la prima e la seconda decade di maggio sono state distribuite in modo irregolare. In molte località della Bulgaria meridionale le precipitazioni di maggio hanno raggiunto e superato le norme mensili

(Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). In parte delle regioni meridionali, le riserve di umidità del suolo negli strati di 50 e 100 cm hanno raggiunto livelli fino al 85% e oltre della capacità di campo (CC), ottimali per lo sviluppo delle colture cerealicole invernali e delle colture primaverili seminate.

A differenza delle regioni meridionali, in alcune località della Bulgaria nord-orientale (stazione agrometeorologica di Silistra), a causa delle precipitazioni inferiori alla norma di aprile e della prima metà di maggio, il livello delle riserve di umidità del suolo per le colture cerealicole invernali alla fine della seconda decade è basso – inferiore al 65% della CC.

Durante l'ultima settimana di maggio è previsto un sostanziale miglioramento delle riserve di umidità del suolo nelle regioni nord-orientali, aspetto di grande importanza per le colture cerealicole invernali, che hanno elevate esigenze di umidità del suolo.

Nel periodo, lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature inferiori alle norme climatiche. Entro la fine di maggio, nelle colture cerealicole invernali avverranno la formazione della granella e la fase di riempimento della cariosside.



Durante questo periodo interfase, i danni al frumento sono causati dalle larve della cimice dei cereali (*Eurygaster* spp.), il che rende necessaria l'ispezione in campo delle colture; quando la densità del parassita supera la soglia di danno economico (2 larve/m²), è necessario effettuare un trattamento alla prima opportunità.

Nel girasole e nel mais, procederà la formazione delle foglie.

Alla fine di maggio, nella vite predominerà la fioritura delle infiorescenze, una fase critica per l'infezione da peronospora e oidio.

Durante l'ultima settimana di maggio, l'aumentato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo limiterà l'esecuzione delle operazioni stagionali di lavorazione del terreno. Nel periodo sono attesi fenomeni di grandine. Per gli alberi da frutto, le colture orticole e i vigneti colpiti dalla grandine, è consigliabile effettuare trattamenti con fungicidi a base di rame per ridurre il rischio di infezioni secondarie da patogeni.

Fonte: NIMH