

Durante l'ultima decade di giugno, la vegetazione delle colture primaverili procederà sotto alte temperature e deficit di umidità del suolo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.06.2025 *Брой:* 6/2025



Dopo le alte temperature di metà giugno, che hanno raggiunto e superato i 35-36° in alcune regioni meridionali, non sono state osservate variazioni delle condizioni agrometeorologiche. Le precipitazioni previste all'inizio del periodo saranno prive di significato economico. A causa di precipitazioni inferiori alla norma e temperature superiori alla norma durante la prima e la seconda decade di giugno, le riserve idriche del suolo per le colture primaverili sono diminuite significativamente. In alcune regioni meridionali, il livello delle riserve idriche nello

strato di 50 cm per mais e girasole è insolitamente basso per l'inizio dell'estate, inferiore al 60% della capacità di campo.

Per la maggior parte dei giorni del prossimo periodo, la vegetazione delle colture primaverili procederà a temperature intorno e al di sopra delle norme climatiche per la terza decade di giugno, e in molte regioni agricole – anche con un deficit di umidità del suolo. Questo è il terzo anno consecutivo con una forte siccità durante i mesi estivi, che è dannosa per le colture di mais e girasole.

Durante il periodo, nei girasoli avverrà la formazione dell'infiorescenza.



L'attacco del punteruolo grigio del mais è particolarmente pericoloso per le colture primaverili. Scienziati dell'Istituto Agricolo – Shumen hanno condotto un'indagine sui campi di mais e girasole nelle regioni di Veliko Tarnovo, Targovishte, Ruse, Razgrad e Shumen e hanno riscontrato danni significativi dal parassita.

Nel mais avverrà la formazione delle foglie. Alla fine di giugno, l'inizio della fase di spigatura sarà osservato negli ibridi precoci di mais.

Parassiti del Mais

Durante la terza decade di giugno, l'ispezione delle colture di mais per la presenza di uno dei parassiti più pericolosi – la piralide del mais – dovrebbe continuare, e se i numeri superano la soglia economica (10 masse di uova per 100 piante), è necessario un trattamento insetticida contro le larve prima che si introducano nei fusti.

La Piralide del Mais (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – un Importante Parassita Economico del Mais

Durante il periodo, nelle regioni di campo si osserverà la maturazione cerosa e completa del grano. Per le colture nei campi ad alta quota, si verificherà la maturazione lattea e una transizione alla maturazione cerosa.

Si prevedono temperature massime elevate e un rischio di incendi durante la raccolta dei cereali.