


Il fattore limitante per lo sviluppo delle colture agricole tardive in agosto rimane il deficit di umidità del suolo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 *Брой:* 8/2025



Ad agosto, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alle norme climatiche e precipitazioni – attorno e al di sotto della norma mensile. Il deficit di umidità del suolo rimarrà un fattore limitante per lo sviluppo delle colture agricole tardive anche ad agosto.

Le precipitazioni cadute alla fine di luglio, dopo il consolidarsi della siccità, sono state locali e insufficienti a colmare il deficit idrico nelle colture agricole tardive. Nella maggior parte delle regioni coltivate, l'umidità produttiva è assente negli strati del suolo di 50 e 100 cm.

Durante la maggior parte dei giorni di agosto, le previsioni di tempo relativamente secco renderanno necessaria l'applicazione di turni di irrigazione più intensivi per le seconde colture e per gli ibridi di mais tardivo. Anche per gli alberi da frutto, che sono nella fase di formazione delle gemme a fiore per l'anno successivo, saranno richiesti maggiori apporti idrici.

La nuova generazione di ibridi di girasole del DAI è un formato altamente intensivo per la gestione della resa

Ad agosto, prima dei consueti tempi per il paese, si completerà lo sviluppo delle colture primaverili tardive. All'inizio di agosto, nelle colture di girasole della Bulgaria meridionale si osserverà la maturazione tecnica (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol), e alla fine della prima e all'inizio della seconda decade - anche negli appezzamenti di gran parte delle regioni coltivate. I primi ibridi di mais coltivati in condizioni irrigue entreranno nella fase di maturazione cerosa e piena durante la prima decade. Gli ibridi medio-tardivi completeranno il loro sviluppo nella terza decade di agosto.

A causa delle sfavorevoli condizioni agrometeorologiche della prima metà dell'estate, con prolungata siccità e temperature estremamente elevate, sono attese rese basse per mais e girasole.

Le persistenti alte temperature di luglio, che continueranno ad agosto, minacciano seriamente il raccolto delle colture primaverili.

L'unico centro di miglioramento genetico del girasole nel paese è l'Istituto Agricolo di Dobrudzha, dove gli sforzi di selezione sono concentrati sulla creazione di nuove varietà di girasole resistenti all'orobanche, alla peronospora e alla siccità. Uno dei nuovi ibridi dell'Istituto – “Dara”, adatto alla coltivazione con la tecnologia “Express” e resistente alla peronospora fino alla razza 731 e all'orobanche fino alla razza G, si comporta molto bene in condizioni di siccità e alte temperature.

Ad agosto, sono previste temperature massime comprese tra 35 e 40°C. Questi valori avranno un impatto negativo sulla fioritura e sulla fecondazione nelle colture orticole di produzione tardiva (cetrioli, fagiolini, zucchine).

Le condizioni meteorologiche durante il mese limiteranno lo sviluppo delle malattie fungine, ad eccezione degli oidi sulle colture orticole, sugli alberi da frutto e sulle viti. È previsto un aumento delle popolazioni di acari. Nei vigneti, è necessario monitorare la densità delle larve della terza generazione della tignoletta della vite. Laddove

necessario, i trattamenti fitosanitari di agosto dovrebbero essere effettuati durante le ore più fresche della giornata (a temperature inferiori a 25°C), utilizzando prodotti con un appropriato intervallo di sicurezza prima del raccolto, in base al periodo di maturazione delle colture.

Fonte: NIMH