

Dicembre – temperature insolitamente alte e precipitazioni localizzate

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



Il clima mite per la stagione durante la maggior parte di novembre e la presenza di ottime riserve di umidità del suolo hanno creato le condizioni per il progresso nello sviluppo delle colture autunnali seminate in ritardo, oltre i termini agrotecnici.

All'inizio di dicembre, le temperature previste superiori alla norma prolungheranno i processi vegetativi dei cereali invernali nelle regioni campestri del paese.

Le precipitazioni diffuse all'inizio del periodo aumenteranno il livello delle riserve di umidità autunnali nello strato di terreno di 100 cm. A causa delle precipitazioni superiori alla norma in ottobre e novembre, le riserve di umidità

del suolo nello strato di un metro per i cereali invernali nella maggior parte delle regioni campestri hanno raggiunto livelli fino al 90% della FC (capacità di campo).

Alla fine del periodo di dieci giorni, le condizioni agrometeorologiche continueranno ad essere determinate da temperature elevate per la stagione. Nelle regioni orientali, sono previste temperature massime superiori a 14-15°C, con una probabilità di provocare un indesiderabile e prematuro gonfiore delle gemme in alcune specie da frutto a fioritura precoce, il che porterebbe a una riduzione della loro resistenza al gelo.

Condizioni adatte per completare gli irrorazioni fitosanitarie autunnali sugli alberi da frutto contro patogeni e parassiti svernanti saranno create durante la seconda metà della prima decade del mese.

Una diminuzione delle temperature, attenuazione e cessazione della vegetazione per grano e orzo sono previste alla fine della prima decade di dicembre.

Durante la seconda e l'inizio della terza decade, le temperature medie giornaliere previste supereranno le norme climatiche ma rimarranno entro limiti che manterranno i cereali invernali in dormienza.

All'inizio dell'inverno, lo stadio di terza foglia predominerà per il grano. Una piccola parte delle colture in alcune regioni orientali e nell'estremo sud del paese, seminate in tempo - a ottobre, sarà nella fase di accestimento, adatta per lo svernamento. I cereali invernali seminati in ritardo, durante la seconda metà di novembre, entreranno nell'inverno non sviluppati, nello stadio iniziale di formazione delle foglie (1-2 foglie). La ragione delle significative differenze nello stato fenologico delle colture è la semina ritardata a causa di condizioni sfavorevoli all'inizio dell'autunno – dopo la siccità e le successive precipitazioni superiori alla norma di ottobre.

Verso la fine di dicembre, è previsto un aumento delle temperature, ma i loro valori medi giornalieri rimarranno al di sotto del minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture autunnali.

Durante il mese, le temperature minime previste, fino a meno 10°C, in condizioni senza copertura nevosa, se sostenute per un periodo più lungo, saranno critiche per le colture nello stadio iniziale di formazione delle foglie.

Le precipitazioni previste a dicembre, vicine alla norma mensile, aumenteranno le riserve di umidità nello strato di terreno di 100 cm a livelli prossimi alla FC (capacità di campo).

