

Gennaio – le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo dinamico con precipitazioni significative

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.12.2025 *Брой:* 12/2025



A gennaio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo dinamico, con periodi alternati di temperature subnormali, superiori alla norma e vicine alle norme climatiche.

I valori medi giornalieri previsti nella maggior parte delle regioni agricole saranno entro limiti che manterranno le colture autunnali e le piantagioni perenni in stato di dormienza. Eccezioni sono previste nelle regioni meridionali e lungo la costa del Mar Nero a metà della prima decade. In queste regioni, si prevede un aumento significativo

delle temperature fino e oltre i 10-15°C e una ripresa a breve termine dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali, ma ciò non porterà a un cambiamento nello stato fenologico delle colture.

A gennaio, il grano svernerà in diverse fasi fenologiche. Predominano le colture nella fase della terza foglia. Nella fase di accestimento, la fase adatta per lo svernamento, si trovano le colture cerealicole invernali in alcune parti delle regioni orientali e sud-occidentali del paese (Silistra, Provadia, Dolen Chiflik, Karnobat e Sandanski). In alcuni luoghi della Bulgaria nord-occidentale, presso la stazione agricola di Nikolaevo, le colture sono nella fase di germinazione e formazione iniziale delle foglie. Non sono robuste e saranno le più vulnerabili all'impatto delle basse temperature di gennaio. I valori minimi previsti, dell'ordine di meno 15 - 18°C, in condizioni senza copertura nevosa e di durata prolungata, saranno critici per le colture cerealicole invernali che non hanno accestito. Valori inferiori a meno 16 - 17°C saranno pericolosi anche per le gemme delle varietà di uva da tavola meno resistenti al freddo.

Durante il mese, le precipitazioni attese, vicine alle norme climatiche, aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati di uno e due metri. All'inizio dell'inverno, il livello delle riserve di umidità nello strato di suolo di 100 cm per le colture autunnali nella maggior parte delle regioni agricole è molto buono – oltre il 90% della capacità di campo.