

All'inizio di marzo, l'elevato contenuto di umidità negli strati superiori del suolo ostacolerà la semina delle colture primaverili precoci.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026



Durante la prima decade di marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alla media. Il clima caldo previsto all'inizio del mese, con valori massimi superiori a 15-16°C, attiverà i processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e nelle colture frutticole nelle regioni di pianura del paese. In questo periodo, nelle colture di frumento delle regioni nord-occidentali prevarrà la fase della terza foglia, mentre nelle regioni orientali e meridionali dominerà la fase di accestimento.

Nelle colture frutticole, in assenza del pericolo di temperature minime critiche, si verificheranno le fasi di rigonfiamento e schiusura delle gemme nelle specie drupacee a fioritura precoce nelle regioni meridionali.

Non sono attese precipitazioni significative durante il periodo. A causa delle precipitazioni superiori alla media di febbraio, le riserve di umidità del suolo nello strato di 100cm nella maggior parte delle regioni di pianura hanno raggiunto livelli fino alla Capacità di Campo. In alcune parti delle regioni meridionali, dove le precipitazioni hanno superato di due o tre volte le norme mensili (Sliven -111l/m², Stara Zagora - 130l/m², Haskovo - 155l/m², Kardzhali - 150l/m², Elhovo - 121l/m², Chirpan - 118l/m²), le colture cerealicole invernali sono in condizioni di eccesso di umidità.



Anche nel prossimo periodo, l'elevato contenuto di umidità degli strati superficiali del suolo in molte località della Bulgaria meridionale ostacolerà la concimazione di copertura delle colture autunno-vernine con fertilizzanti minerali azotati e l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina sulle aree destinate alla semina con colture primaverili precoci (veccia, pisello, orzo primaverile).

Dopo il previsto breve raffreddamento alla fine della prima decade, per la maggior parte dei giorni della seconda sono previste temperature medie giornaliere superiori al minimo biologico necessario per la vegetazione delle colture cerealicole invernali.



Durante la terza decade di marzo, lo sviluppo delle colture agricole procederà con temperature vicine alle norme climatiche. Entro la fine del mese, nelle colture di frumento prevarrà la fase di accestimento. Nelle colture cerealicole invernali seminate entro i termini agrotecnici, si osserverà un aumento del coefficiente di accestimento.

Durante marzo, si verificheranno le seguenti fasi nelle colture frutticole: rigonfiamento, schiusura delle gemme a frutto, formazione del bottone florale e fioritura nelle specie drupacee a fioritura precoce (mandorlo, albicocco, pesco, ciliegio). Le temperature minime previste durante il mese, fino a meno 7°C, saranno critiche per gli alberi da frutto che avranno raggiunto le fasi di formazione del bottone florale e fioritura.

Le precipitazioni previste a marzo, vicine alle norme mensili, manterranno buone riserve di umidità del suolo per le colture cerealicole invernali. A causa delle precipitazioni superiori alla media di febbraio (Shumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrich - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², Stara Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Chirpan - 119 l/m²), le riserve di umidità nello strato di 100cm di suolo per le colture autunno-vernine hanno raggiunto livelli vicini alla Capacità di Campo.

A metà marzo, inizia il periodo agrotecnico (15-20.03) per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale, e a metà della terza decade (25.03-5.04) – nella Pianura Danubiana.

