Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Ad ottobre: quali saranno le condizioni agrometeorologiche e quando sono le date ottimali di semina

Растителна Защита

Data 09.10.2026 | **Numero** 10/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Lingua** IT
www.plant-protection.com/article/2478?lang=it



Durante i primi dieci giorni di ottobre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature medie giornaliere intorno e al di sotto delle norme climatiche. Il previsto tempo fresco e piovoso nella maggior parte dei giorni del periodo sarà un prerequisito per lo sviluppo di agenti patogeni - marciume bruno tardivo sui frutti delle varietà autunnali di alberi da frutto (Monilia fructigena), muffa grigia (Botrytis cinerea) sulla vendemmia non raccolta. Alla fine del periodo di dieci giorni sono previste gelate diffuse, il che richiede la raccolta tempestiva delle colture orticole soggette a gelate.



Marciume bruno tardivo sui frutti delle varietà autunnali di alberi da frutto (Monilia fructigena)

Durante i primi dieci giorni di ottobre sono previste precipitazioni, un miglioramento delle condizioni degli strati superiori del suolo e delle condizioni per l'esecuzione delle lavorazioni stagionali del terreno. La siccità alla fine dell'estate ha ostacolato l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina delle aree destinate alla

ISSN 2815-522X

semina delle colture invernali. Per questo motivo sono state mancate le scadenze agrotecniche di settembre per la semina della colza invernale.



Ottobre è il periodo ottimale per la semina dei cereali invernali. Durante i primi dieci giorni è la scadenza agrotecnica per la semina del frumento nella Bulgaria settentrionale, dal 15 al 25 ottobre - nella Bulgaria meridionale, e alla fine del mese – nelle aree lungo la costa del Mar Nero.

Le condizioni agrometeorologiche nel periodo 9-16 ottobre saranno dinamiche. All'inizio di questo periodo di sette giorni, le temperature medie giornaliere previste saranno al di sopra della norma, e durante il resto dello stesso saranno entro le norme climatiche. All'inizio del periodo sono previste precipitazioni locali e leggere nella Bulgaria occidentale, e verso la metà anche nelle aree di pianura della Bulgaria centrale e orientale. In alcuni luoghi le quantità saranno significative, il che migliorerà l'umidificazione degli strati superiori del suolo. Non sono previste condizioni per la formazione di gelate.

Ad eccezione di alcune aree della Bulgaria occidentale, durante la prima metà del periodo previsto, le condizioni agrometeorologiche saranno adatte per la raccolta finale dei vigneti e dei frutteti, la pulizia delle aree dalle colture a fila e dagli ortaggi tardivi, nonché per il sollevamento del foraggio e della barbabietola da zucchero, che sono nella fase di maturità tecnologica. Le condizioni saranno adatte per lo svolgimento di attività agrotecniche legate alla semina dei cereali invernali. In caso di forte infestazione di erbe infestanti delle aree, è consigliabile effettuare l'applicazione autunnale di erbicidi.



Fino alla metà del periodo, le condizioni agrometeorologiche permetteranno l'applicazione di fertilizzanti minerali e organici, nonché la piantagione pre-invernale di cipolle per verde, aglio invernale, lattuga e spinaci.

Le piogge previste durante la seconda metà del periodo previsto limiteranno notevolmente le possibilità di svolgere attività agricole.

Durante il secondo e il terzo periodo di dieci giorni, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine a quelle usuali. Le precipitazioni previste durante la prima metà del secondo periodo di dieci giorni, all'inizio del terzo e alla fine del mese, miglioreranno le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e le condizioni per il corso delle fasi iniziali della vegetazione delle colture invernali seminate. Alla fine di ottobre, nel frumento e nell'orzo, a seconda delle date di semina, si osserveranno le fasi di emergenza e formazione di 1-2-3 foglie.



In ottobre, le colture autunnali sono attaccate dai parassiti. Nei cereali invernali, deve essere monitorata la presenza di arvicola campestre, carabide del frumento e mosche del frumento. Quando il numero di parassiti supera la soglia economica di danno (SED),

ISSN 2815-522X

è necessario un trattamento tempestivo. Per l'arvicola campestre, la SED è di 2 colonie attive per decaro, per il carabide comune del frumento - 3 larve/m².