Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

'Nella seconda metà di novembre, le condizioni agrometeorologiche consentiranno il completamento delle semine autunnali, la messa a dimora degli alberi da frutto e lo svolgimento delle attività fitosanitarie nei frutteti.'

Растителна Защита

Data 13.12.2026 | **Numero** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Lingua** IT
www.plant-protection.com/article/2491?lang=it



Nella maggior parte dei giorni della prima metà di novembre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile e stagionalmente freddo. In questo periodo è prevista una precipitazione superiore alla norma, che in molte parti del Paese ritarderà la semina del frumento e dell'orzo. La siccità all'inizio dell'autunno ha ostacolato l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina delle superfici e per questo motivo, in gran parte delle regioni di pianura, sono state mancate le scadenze agrotecniche di ottobre per la semina delle colture cerealicole invernali.

Fino a metà novembre, lo sviluppo delle colture invernali seminate procederà a ritmo rallentato. Negli altopiani, dove all'inizio del mese non sono escluse precipitazioni, anche nevose, i valori previsti delle temperature medie giornaliere saranno prossimi al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali.

Le precipitazioni previste all'inizio e alla fine del periodo (13 - 19.11.2026) manterranno un elevato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo, il che ritarderà ulteriormente le misure agrotecniche stagionali, la più importante delle quali è il completamento della semina del frumento. Le precipitazioni durante la prima decade di novembre hanno superato i 60-70 l/m² in molte parti del Paese e hanno fortemente aumentato anche le riserve idriche negli strati più profondi del suolo. In parte della Pianura Danubiana, nelle regioni orientali e meridionali (stazioni agrometeorologiche: Novachene, Nikolaevo, Silistra, Dolni Chiflik, Plovdiv, Haskovo, Yambol, Karnobat), le

ISSN 2815-522X

riserve di umidità del suolo nello strato di 50 e 100 cm hanno raggiunto livelli superiori all'80% della CC (Capacità di Campo).

Un aumento delle temperature e un cambiamento positivo delle condizioni agrometeorologiche sono attesi durante la seconda metà di novembre. In questo periodo, i processi vegetativi nelle colture autunnali procederanno a temperature vicine alle norme climatiche e con buone riserve di umidità del suolo. Alla fine di novembre, nel frumento e nell'orzo, a seconda delle date di semina, si osserveranno diverse fasi. La fase di emergenza e di formazione delle foglie iniziali si verificherà nelle colture seminate tardivamente a novembre.



Nelle colture cerealicole invernali seminate in ottobre prevarrà la fase della terza foglia (Bazovets, Silistra, Provadia, Karnobat). Durante il mese non sono previste temperature minime critiche per le colture agricole.



Durante la seconda metà di novembre non sono previste precipitazioni significative e le condizioni permetteranno il completamento delle semine autunnali, la messa a dimora degli alberi da frutto e l'attuazione delle attività fitosanitarie nei frutteti.



Durante il mese deve proseguire il monitoraggio delle colture autunnali per i parassiti. Alla fine di ottobre è stata accertata una popolazione aumentata dell'arvicola comune e a novembre, se la popolazione del parassita supera la soglia economica (oltre 2 colonie attive per decaro), è necessario effettuare il trattamento delle superfici con i rodenticidi autorizzati.