

Manna della vite (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



A seconda dell'età delle foglie, la peronospora forma due tipi di macchie: oleose e a mosaico. Sulla loro pagina inferiore si forma una patina bianca sporulante. In caso di attacco grave, le foglie si seccano e cadono prematuramente. In condizioni favorevoli (umidità relativa dell'aria superiore al 75%) compaiono macchie clorotiche sulle infiorescenze e sui grappoli, su cui si forma anch'essa una patina bianca sporulante. Quando le macchie sono alla base del grappolo, l'intero grappolo si secca. L'infezione delle bacche cessa quando, per le varietà di uva da vino, raggiungono la dimensione di un "pisello", e per le varietà di uva da tavola la dimensione di un "fagiolo".

Strategia di controllo dei parassiti:

Il trattamento viene effettuato quando si verificano condizioni favorevoli all'infezione (temperatura dell'aria superiore a 13°C e piogge frequenti ma leggere) e durante lo stadio fenologico sensibile della vite "fioritura" - "pisello".

Prodotti fitosanitari autorizzati:

acrobate r – 0,25%; acrobate plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; anthracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banko 500 – 0,2%; bordeaux mix 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha applicato in miscela in botte con prodotti contenenti folpet; dimix 500 sc - 30 ml/ha applicato in miscela in botte con prodotti contenenti mancozeb; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%– intervallo di trattamento 7-10 giorni - 0,2% ogni 10-14 giorni; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l acqua; corseit r df – 0,25%; corseit r wp – 0,25% fino al 09.2017; corseit max wp – 0,15%; cuadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% fino al 06.2017; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; ossicloruro di rame 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha fino al 06.2017; mical flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sancozeb 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobilurin df /discus df - 0,015 % +acrobate mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % +ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.