

A giugno, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli allo sviluppo di malattie fungine.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2017 Брой: 6/2017



A giugno, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli allo sviluppo di numerose malattie fungine: peronospora su vite e colture orticole, marciume bruno tardivo sui frutti delle varietà tardive di ciliegio, spaccatura dei frutti nei frutteti, ecc. Condizioni più adatte per effettuare i trattamenti fitosanitari si verificheranno all'inizio della prima, durante la seconda metà della seconda e nella maggior parte dei giorni della terza decade del mese. Nel corso del mese, le temperature massime previste, intorno ai 34-35°C, avranno un impatto negativo sulla fioritura e sulla fecondazione delle colture orticole.

All'inizio di giugno, lo sviluppo delle colture agricole procederà a ritmo accelerato, con temperature superiori alla norma e, nella maggior parte del paese, con buone e ottime riserve di umidità del suolo a seguito delle precipitazioni significative della terza decade di maggio (Vratsa – 57 l/m², Lovech – 41 l/m², Pleven - 106 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Svishtov – 68 l/m², Ruse – 51 l/m², Silistra – 48 l/m²). Eccezioni si osserveranno solo in

località isolate delle regioni meridionali e sudorientali, dove le precipitazioni non hanno avuto particolare rilevanza economica, inferiori a 10 l/m².

A metà della prima decade è prevista una diminuzione e una normalizzazione delle temperature e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Le precipitazioni attese entro la fine della prima decade manterranno le riserve di umidità del suolo entro intervalli ottimali per la vegetazione delle colture primaverili. Avranno anche un effetto benefico sulle colture cerealicole invernali nei campi più alti, dove sarà in corso la fase di riempimento della granella. Nel frumento delle regioni di pianura del paese, si osserverà la fase di maturazione lattea. Nell'orzo, avverrà il passaggio dalla maturazione lattea a quella cerosa e cerosa. Durante la prima decade, la colza entrerà nella fase di maturazione. In questo periodo è prevista una maggiore probabilità di grandine, con rischio di allettamento delle colture e danni aggiuntivi alle colture agricole. In caso di danni da grandine, si raccomanda di trattare le colture orticole e frutticole colpite alla prima occasione con fungicidi appropriati (a base di rame).

Durante la maggior parte dei giorni della seconda e terza decade, lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alla norma. All'inizio della seconda decade, nelle aree di campo, l'orzo sarà prevalentemente nella fase di maturazione di massa. Alla fine della decade, il frumento sarà prevalentemente nella fase di maturazione cerosa.

Entro la fine di giugno, alcune delle colture primaverili entreranno nelle fasi riproduttive del loro sviluppo: nel girasole si osserverà l'inizio della fioritura, e negli ibridi precoci di mais – la formazione della pannocchia e la fioritura della spiga. Nel corso del mese, le temperature massime previste, intorno ai 34-35°C, avranno un impatto negativo sulla fioritura e sulla fecondazione delle colture orticole.

Fonte: NIMH - BAS