

# Cura della protezione delle piante a luglio nei vigneti

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



*In questo periodo, le viti si trovano nello stadio fenologico che va dalla "fine della fioritura" all'"inizio della maturazione degli acini" per le varietà precoci.*

## Principali parassiti del periodo

**Peronospora della vite** *Plasmopara viticola*

**Oidio** *Oidium tuckeri*

**Muffa grigia** *Botrytis cinerea*

**Tumore batterico** *Agrobacterium vitis*

**Tignola della vite** *Lobesia botrana*

**Tignoletta della vite** *Theresimima ampelophaga*

**Cocciniglia della vite** *Pulvinaria vitis*

**Ragnetto giallo della vite** *Schizotetranychus viticola*

### **Tumore batterico**

Nelle piante infette sulle parti lignificate, vicino alla superficie del suolo o immediatamente sotto di essa, si osservano rigonfiamenti (tumori). Le piante malate mostrano crescita stentata, foglie clorotiche e sono facilmente soggette a danni da freddo durante un inverno rigido.

#### **Strategia di controllo del parassita:**

A luglio, le viti che mostrano sintomi della malattia devono essere segnalate.

### **Cocciniglia della vite**

La schiusa delle larve continua durante la prima metà di luglio. Causano danni succhiando la linfa dalle foglie, dai germogli e dai grappoli. Effettuano una muta, si nutrono per un certo periodo, poi lasciano i siti di alimentazione e si spostano nelle loro posizioni di svernamento. Come risultato del danno, le viti si indeboliscono.

#### **Strategia di controllo del parassita:**

Il controllo chimico viene effettuato contro le giovani larve.

#### **Prodotto fitosanitario autorizzato:**

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

