

Migliorare le condizioni per lo sviluppo delle colture agricole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Dopo il tempo secco e caldo, è previsto un cambiamento sostanziale delle condizioni agrometeorologiche nel corso del prossimo periodo di sette giorni. A metà luglio, sono previste precipitazioni significative, un calo delle temperature e un miglioramento delle condizioni per lo sviluppo delle colture agricole. Ci sarà la probabilità di grandine.

Dopo il tempo secco e caldo, è previsto un cambiamento sostanziale delle condizioni agrometeorologiche nel corso del prossimo periodo di sette giorni.

Le temperature estremamente elevate e la bassa umidità atmosferica all'inizio della seconda decade di luglio hanno avuto un effetto negativo su parte delle colture primaverili e hanno causato la caduta di fiori e frutti in alcune colture orticole (pomodori, cetrioli, zucchine, fagiolini). A differenza delle regioni settentrionali e centrali, in molte località della Bulgaria meridionale le precipitazioni di luglio non hanno avuto significato economico, il che ha portato a un approfondimento del deficit di umidità del suolo. In alcune località della Pianura Tracia (le stazioni agrometeorologiche di Pazardzhik, Plovdiv, Sliven) non c'è umidità nello strato di suolo di 50 cm, e nello strato di 100 cm le riserve di umidità del suolo sono scarse – al di sotto del 50–55% della capacità di campo.

Durante la prima metà del prossimo periodo di sette giorni, sono previste precipitazioni significative, un calo delle temperature e un miglioramento delle condizioni per lo sviluppo delle colture agricole.

Entro la fine della seconda decade, con temperature vicine alla norma e riserve di umidità del suolo migliorate, continueranno la fioritura, la fecondazione e il riempimento dei semi nel girasole. Nel mais, a seconda della sua precocità, si osserveranno diverse fasi – dall'emissione delle pannocchie negli ibridi più tardivi all'inizio della fase di maturazione lattea negli ibridi di mais precoci in alcune località delle regioni meridionali del paese. Nel cotone, si osserverà l'inizio della fase di fioritura entro la fine del periodo.

Durante il periodo, è nuovamente prevista la probabilità di grandine e il rischio di allettamento delle spighe. Condizioni più adatte per effettuare la raccolta del frumento si verificheranno alla fine della seconda decade di luglio.

Attualmente, le rese medie del frumento ottenute sono da buone a molto buone, in molte località del paese superiori a 500 kg/da.