

Previsioni agrometeorologiche settimanali per la fine di luglio e l'inizio di agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



Entro fine luglio e nei primi giorni di agosto, lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alle norme climatiche, e in molte parti del paese – con riserve di umidità del suolo migliorate.

Dopo i temporali, la grandine e le piogge torrenziali (Ruse - 45 l/m², Silistra - 43 l/m² e Shumen - 33 l/m²) caduti negli ultimi giorni del periodo passato, nel periodo seguente è prevista una stabilizzazione del tempo e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. La grandine caduta in molti luoghi della Bulgaria settentrionale (Vratsa, Polski Trambesh, Troyan, Ruse, Tsarev Brod) ancora una volta non ha risparmiato le colture agricole. Sono stati causati danni a parte delle coltivazioni di grano non ancora raccolte (allettamento delle colture, sfaldamento delle spighe), così come alle colture primaverili, agli ortaggi e agli alberi da frutto.

All'inizio del prossimo periodo, alla prima occasione, le colture orticole, gli alberi da frutto e le viti colpiti dalla grandine dovrebbero preferibilmente essere trattati con fungicidi a base di rame per accelerare la cicatrizzazione delle ferite e ridurre le infezioni secondarie da patogeni (muffa grigia sulle viti, marciume bruno tardivo sui frutti degli alberi da frutto, peronospora della patata e *Alternaria* sui pomodori).

Entro fine luglio e nei primi giorni di agosto, lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alle norme climatiche, e in molte parti del paese – con riserve di umidità del suolo migliorate. Durante il periodo, negli ibridi di mais precoci, si osserverà la fase di maturazione lattea e un passaggio dalla maturazione lattea a quella cerosa nelle coltivazioni in alcune zone della Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali del paese. Nel girasole, avverrà il riempimento del seme. All'inizio di agosto, parte delle coltivazioni nella Bulgaria meridionale entrerà nella fase iniziale di maturazione.

Durante il periodo, l'elevato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo ritarderà in alcuni luoghi il completamento della raccolta del grano.

Fonte: NIMH-BAS