

Previsão agrometeorológica para março de 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 *Брой:* 3/2019



No início de março, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo quente para a estação. Durante a primeira década, na maioria das regiões aráveis do país, os valores previstos das temperaturas médias diárias excederão o mínimo biológico necessário para a retomada dos processos de vegetação nas culturas de cereais de inverno e na colza.

No início da segunda década, prevê-se uma diminuição das temperaturas, mais significativa no Norte da Bulgária e nos campos altos, o que limitará e atrasará o desenvolvimento das culturas agrícolas. Durante esta década, condições para vegetação lenta nas culturas de cereais de inverno serão criadas principalmente nas regiões extremo-sudeste e sul do país.

No final da segunda e início da terceira década de março, espera-se uma melhoria nas condições de temperatura e ativação dos processos de vegetação nas culturas de outono e plantações perenes. Até o final de março, a maioria dos povoamentos de trigo e cevada de desenvolvimento tardio que hibernaram no estágio de 2-3 folhas entrará no estágio de perfilhamento. Nas culturas de cereais de inverno que perfilharam no outono, será observado um aumento no coeficiente de perfilhamento. No final de março, a colza que hibernou no estágio de roseta formará ramos.

Em março, ocorrerão as fases de inchaço e rebentamento das gemas nas culturas frutíferas.

No final do mês, nas espécies de floração precoce (amendoeira, damasqueiro, pêssego) será observado o estágio de gema floral e, em alguns locais, principalmente nas regiões do sul, também o início da floração. Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, até -8°C , representarão um risco para as árvores frutíferas mais avançadas que entraram nas fases de formação de gemas e floração. A precipitação esperada em março, em torno da norma, aumentará as reservas de humidade do solo nas camadas de um metro e mais profundas. No final de fevereiro, na maioria das regiões aráveis, as reservas de humidade do solo para culturas de cereais de inverno na camada de um metro estavam acima de 90% da capacidade de campo (CC). Exceções foram observadas em locais na Planície do Danúbio (estação agrometeorológica de Novachene), nas regiões extremo-sul (Haskovo) e leste (D. Chiflik), onde o nível das reservas de humidade era mais baixo – 85–86% da CC. Durante o mês, condições mais favoráveis para realizar o preparo pré-semeadura das áreas destinadas à semeadura com culturas de primavera precoces e médias-precoces, e para realizar pulverizações de proteção de plantas em pomares, ocorrerão no início do mês, na segunda metade da segunda década e no meio da terceira década. Em meados de março começa a janela agrotécnica (15–20.03) para a semeadura de girassol no Sul da Bulgária, e no meio da terceira década (25.03–5.04) – na Planície do Danúbio.

Fonte: NIMH