

Condições adequadas para a realização de operações de preparo do solo pré-semeadura e semeadura de girassol estarão presentes no final de março.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.03.2019 *Брой:* 3/2019



No período vindouro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas para a terceira década de março.

De forma atípica para o início da primavera, o desenvolvimento das culturas de inverno em parte das regiões agrícolas do país ocorrerá sob reservas de humidade do solo insatisfatórias na camada de 50 cm – consequência das precipitações abaixo do normal no final do inverno, das temperaturas de março acima do

normal e da contínua vegetação ativa das culturas. No final da segunda década de março, as reservas de humidade mais baixas na camada de 50 cm, medidas em trigo, foram registradas em locais das regiões sul e sudeste do país, abaixo de 65% da capacidade de campo. As melhores reservas de humidade, acima de 85–90% da capacidade de campo, são reportadas para as culturas de inverno nas partes noroeste da Planície do Danúbio.

Para o final do período, espera-se uma diminuição das temperaturas e uma mudança nas condições agrometeorológicas. Os valores previstos para as temperaturas mínimas, em alguns locais até -2°C, representam um risco para a floração e vingamento dos frutos das espécies de caroço que estão avançadas no seu desenvolvimento, especialmente se as baixas temperaturas persistirem por um período mais longo.

É esperada nova precipitação e as condições para a germinação das culturas de primavera semeadas irão melhorar.

No trigo, o estágio de crescimento de afilhamento será observado em massa, e em alguns locais das regiões nordeste (Tsarev Brod, Dolni Chiflik) – o início do alongamento do colmo. Na colza, estará em curso a formação da ramificação.

Durante a maioria dos dias do período, as condições serão adequadas para realizar o preparo do solo pré-semeadura e a sementeira do girassol. Durante o período, expira o prazo ótimo para a sementeira do girassol no Sul da Bulgária. Em meados da terceira década de março, inicia-se a janela agrotécnica para a sementeira do girassol na Planície do Danúbio (25.03–05.04).

Fonte: NIMH