

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.04.2019 Брой: 4/2019



No final de março, as condições agrometeorológicas foram determinadas por temperaturas médias diárias superiores às normas climáticas e precipitações sem significado econômico, o que condicionou o desenvolvimento das culturas agrícolas sob reservas limitadas de umidade na camada do solo habitada pelas raízes.

No início de abril, prevê-se uma diminuição das temperaturas mínimas (até menos 2 – 3°C) e condições para a formação de geada, o que representará um risco de danos para as árvores frutíferas que estão entrando na fase de floração.

Durante a segunda metade do período, prevê-se um aumento das temperaturas, mas a ausência de precipitações significativas será um fator limitante para os estágios iniciais de desenvolvimento das culturas de primavera semeadas e para o andamento dos processos vegetativos nas culturas semeadas no outono.

Durante o período, ocorrerão os estágios de perfilhamento e transição do perfilhamento para o alongamento do colmo no trigo e na cevada. Na colza de inverno, será observado o estágio de ramificação. Nas espécies de frutas com caroço, ocorrerá a fase de floração.

O período coincide com a janela de tempo agrotécnica para a semeadura do girassol na Planície Danubiana.

Durante a maior parte dos próximos sete dias, as condições serão adequadas para realizar o preparo do solo pré-semeadura e a semeadura do girassol. Em dias sem vento, será possível realizar tratamentos com herbicidas nas culturas de cereais.

Fonte NIMH