


No início de maio, existem condições adequadas para a realização das atividades agrotécnicas sazonais.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.05.2019 *Брой:* 5/2019



Espera-se uma mudança nas condições agrometeorológicas no final de abril e início de maio. O aumento previsto das temperaturas, combinado com a melhoria das reservas de humidade do solo do período anterior, resultante da precipitação registada, criará condições para um curso acelerado dos processos de vegetação nas culturas agrícolas.

Durante o período, o trigo no Norte da Bulgária estará na fase de alongamento do colmo, enquanto em partes do Sul da Bulgária terá início a fase de espigamento. Nas culturas de colza na Planície Danubiana, ocorrerão

as fases de botão floral e floração, e no Sul da Bulgária observar-se-á em massa a floração e a formação de vagens. Nas áreas semeadas com girassol, ocorrerá a formação de folhas (formação de 1–2 pares de folhas verdadeiras). No milho, observar-se-á a emergência e o início da formação das folhas.

Nas culturas de cereais de inverno, durante as fases de alongamento do colmo e espigamento, os danos nas plantas são causados pelo crisomelídeo comum dos cereais e pelo percevejo-dos-cereais. As culturas também devem ser monitorizadas quanto ao aparecimento e desenvolvimento do oídio. Quando o desenvolvimento de doenças e pragas excede o limiar económico de nocividade, é necessário realizar tratamentos com pesticidas.

Nas espécies frutíferas, após o término da floração, são realizados tratamentos com fungicidas contra a murcha das flores (podridão castanha precoce) em frutas de caroço, a enrola das folhas do pessegueiro e a sarna em espécies de frutas de pomóideas.

Condições favoráveis para a realização de atividades agrotécnicas sazonais (pulverização para proteção de plantas, cultivo do solo em pomares) ocorrerão no início e no final do período, quando está previsto um tempo relativamente mais estável sem precipitação.

Fonte: NIMH