

O clima úmido durante a primeira quinzena de maio é uma condição prévia para o desenvolvimento de patógenos fúngicos.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



O clima úmido criará condições para a ocorrência e desenvolvimento de patógenos fúngicos, cuja prevenção requer a aplicação de fungicidas sistêmicos.

No período de 3 a 9 de maio, são previstas condições agrometeorológicas dinâmicas e variáveis. Os processos de vegetação nas culturas agrícolas ocorrerão com temperaturas médias abaixo das normas climáticas e com precipitações frequentes, de acordo com a previsão sinótica.

Na primeira metade do período, é esperada precipitação, em muitos lugares das áreas de planície do país também intensa, o que manterá as reservas de umidade do solo melhoradas após a superada seca do início da primavera. O clima ventoso esperado limitará adicionalmente as possibilidades de realizar atividades de proteção de plantas em povoamentos de culturas cerealíferas de inverno, canola e em plantações frutíferas permanentes.

Durante o período, o trigo estará nas fases de alongamento do colmo, transição do alongamento do colmo para o espigamento e espigamento. Na canola, serão observados floração, formação e crescimento das vagens. Nas culturas de primavera semeadas, ocorrerá a formação das folhas.

O clima úmido criará condições para a ocorrência e desenvolvimento de patógenos fúngicos, cuja prevenção requer a aplicação de fungicidas sistêmicos.

No final do período, está prevista uma melhora nas condições agrometeorológicas (um início de aumento das temperaturas, enfraquecimento do vento, baixa probabilidade de precipitação) e a criação de oportunidades mais favoráveis para a realização de atividades agrotécnicas.

Fonte: NIMH