

Previsão agrometeorológica para o mês de maio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 Брой: 5/2019



No início de maio, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá sob temperaturas abaixo do normal e com boas reservas de humidade do solo, resultado da precipitação acima do normal em abril. As precipitações de abril (Pleven - 116l/m², Veliko Tarnovo - 63l/m², Lovech – 125l/m², Razgrad - 64l/m², Dobrich - 60l/m², Sófia - 78l/m², Sandanski - 58l/m², Pazardzhik - 60l/m², Plovdiv - 58l/m², Haskovo - 89l/m², Kardzhali - 75l/m², Elhovo - 79l/m², Stara Zagora - 55l/m², Karnobat - 52l/m²), após a seca do início da primavera, foram decisivas para superar o défice de humidade do solo nas culturas de outono. As precipitações previstas durante a primeira década de maio manterão um nível muito bom de reservas de humidade nas camadas de solo de 50cm e 100cm, acima de 85% da capacidade de campo (CC). Esta precipitação terá um efeito benéfico nas culturas de cereais de inverno e na colza, que se encontram na fase reprodutiva do seu desenvolvimento, com requisitos aumentados de humidade do solo. Durante este período, no trigo e na cevada nas regiões de campo do país,

ocorrerão a fase de alongamento do colmo, a transição do alongamento do colmo para o espigamento e a fase de espigamento. Na colza, terão lugar a floração, a fertilização e a formação das vagens.

No final da primeira década, estão previstas geadas de solo nos campos mais elevados, o que deve ser tido em conta no transplante de mudas de hortícolas e tabaco. Uma melhoria substancial das condições térmicas e uma aceleração dos processos de vegetação nas culturas agrícolas são esperadas durante a primeira metade da segunda década.

Durante a segunda metade de maio, as condições agrometeorológicas permanecerão instáveis, com precipitações frequentes. O desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a temperaturas próximas e acima das normas climáticas. Durante este período, a formação e o enchimento do grão nas culturas de cereais de inverno ocorrerão sob reservas de humidade do solo muito boas e ótimas. No final da terceira década, no trigo e na cevada nas regiões do sul e em locais da Planície Danubiana, será observado o início da fase de maturação leitosa. Durante o mês, ocorrerá a formação de folhas no milho e no girassol. No final de maio, no girassol semeado dentro do prazo agrotécnico, será observada a formação da inflorescência. As precipitações frequentes em maio criarão condições para um aumento do fundo de infeção de várias doenças fúngicas: no trigo, as ferrugens (castanha, amarela) e a fusariose da espiga; os míldios nas culturas hortícolas e na videira; a podridão castanha precoce e a cribadura nos frutos de caroço, a sarna nas espécies de frutos pomáceos, etc. Durante o mês, condições mais adequadas para realizar pulverizações de proteção das plantas ocorrerão no meio da primeira, na primeira metade da segunda e na terceira década.

Em maio, está prevista uma probabilidade aumentada de granizo. Em caso de danos parciais por granizo, é aconselhável que as culturas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas à base de cobre para uma cicatrização mais rápida das feridas e redução do risco de infeções secundárias.

Fonte: NIMH