

Doenças e pragas do morango e da framboesa em maio

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 *Брой:* 5/2019



No caso da **framboesa** as pulverizações são dirigidas contra didimela, antracnose, seca das bases dos rebentos/leptosferiose/, podridão cinzenta, agrilus da framboesa, mosca-galha da framboesa, galha da framboesa e besouro da framboesa. Contra as doenças utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Dithane M45 – 0,2%, Kocide 200 WG – 0,12%, Funguran OH 50 WP – 0,15% e Cuprozet Gold M – 0,15%. Para o controlo das pragas da framboesa não há nenhum inseticida incluído na lista de produtos fitofarmacêuticos autorizados. Segundo Tsolova, 2002, os inseticidas Bi-58 – 0,1%, Karate Zeon – 0,02%, Vaztak New – 0,015% e Decis 2,5 EC – 0,04% são eficazes contra as pragas indicadas. A autora recomenda que os dois primeiros inseticidas

sejam utilizados na primeira pulverização, e os outros dois na segunda pulverização. Na ocorrência de ácaros, aplica-se NeemAzal TS numa concentração de 0,3–0,5%. Este bioproduto também afeta pulgões e cigarrinhas.

Plantações de morango em maio são pulverizadas contra podridão cinzenta, oídio, gorgulho do morango e gorgulho-do-caule do morango. Contra a podridão cinzenta utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Switch 62,5 WG – 100 g/da, Signum WG – 75 g/da, Synpro SC – 150 ml/da, Captan – 150 g/da, Thiram 80 WG – 0,3%, Shavit F WDG – 0,2%, Prolectus 50 WG – 80–120 g/da. Para proteger o morango do oídio, a pulverização é realizada com um dos fungicidas aprovados: Systhane 20 EW – 30 ml/da, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/da, Cidely Top DC – 10 ml/da, Ortiva Top SC – 100 ml/da, Shavit F 72 WDG – 0,2%, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/da. Dos fungicidas listados, o Cidely Top DC também é eficaz contra a mancha branca das folhas.

Contra os gorgulhos, utiliza-se Avant 150 EC – 25 ml/da ou Calypso 480 SC – 20 ml/da.