

11 de abril de 2024

Tempo instável e temperaturas acima do normal

Condições climáticas instáveis e temperaturas acima da média para a época estão previstas para a região durante os próximos dias.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 *Брой:* 6/2019



Na maioria dos dias do período de sete dias (21–27.06.2019), as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas acima do normal. No início do verão, as temperaturas máximas extremamente altas previstas, em alguns locais até 37–38°C, dificultarão a vegetação das culturas de primavera. Esses valores terão um impacto negativo na formação dos órgãos reprodutivos de algumas culturas hortícolas (feijão-de-vagem, tomate, pimentão, pepino, etc.), e sob baixa umidade atmosférica podem causar a

queda de flores e frutos. Uma diminuição das temperaturas e uma melhoria nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas está prevista para o meio do período.

Durante o período, no trigo nas áreas de planície, serão observadas as fases de grão pastoso e maturação completa, e nos campos mais elevados – grão leitoso e transição para grão pastoso. No girassol, ocorrerá a formação da inflorescência, e em alguns locais da Planície do Danúbio (as estações agrometeorológicas de Băzovec, Pavlikeni) também será observado o início da floração nas lavouras. No milho, ocorrerá a formação das folhas. No final do período, nos híbridos precoces, será observado o início do pendão. Até o pendão, as lavouras de milho devem ser inspecionadas quanto à presença de uma das pragas economicamente mais importantes – a broca-europeia-do-milho. Quando a densidade da praga excede o nível de dano econômico (NDE) (10 massas de ovos por 100 plantas), é necessário um tratamento inseticida oportuno (contra as larvas jovens antes que elas penetrem nos colmos).

A precipitação durante o período em muitas partes do país, com exceção das regiões sudeste e da costa do Mar Negro, irá temporariamente impedir a colheita da cevada e do trigo. Uma probabilidade aumentada de granizo está novamente prevista, com risco de acamamento das culturas e debulha do grão. Após o granizo, recomenda-se que as culturas hortícolas e vinhas afetadas sejam tratadas com fungicidas à base de cobre na primeira oportunidade.

Fonte: NIMH