

Previsão agrometeorológica para agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Na maioria dos dias da primeira década de agosto, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas em torno e ligeiramente abaixo da média para o período. As condições meteorológicas previstas para o início do mês aumentarão o nível de infecções por certos patógenos fúngicos: requeimas em culturas hortícolas de produção tardia ao ar livre, podridão parda tardia em pomares e mofo cinzento nas primeiras variedades de uva em maturação.

As chuvas do final de julho, que em locais das regiões noroeste e central ultrapassaram 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vratsa, Montana, Lovech, V. Tarnovo), e as precipitações esperadas durante a primeira década de agosto, terão um efeito benéfico nas segundas culturas e nos híbridos de milho mais tardios, nos quais ocorrerá a formação e o enchimento do grão. Durante a década, os híbridos de milho médio-precoces estarão no estágio

de maturação leitosa, enquanto os híbridos precoces atingirão a maturação cerosa e plena (estações agrometeorológicas Bazovets, Kneja, Glavinitsa, Pazardzhik, Plovdiv). No girassol, na Planície do Danúbio e nas regiões do sul, ocorrerá o estágio de maturação.

No final da primeira década, prevê-se um aumento substancial das temperaturas e uma progressão acelerada dos estágios finais de desenvolvimento das culturas tardias ao ar livre. Durante a segunda e terceira décadas, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo relativamente seco e temperaturas em torno e acima das normas climáticas.

Durante a segunda metade de agosto, grande parte das culturas tardias ao ar livre completará seu desenvolvimento. No girassol, será observada a maturação técnica em massa, e na soja – o estágio de maturação. No final do mês, a maturação cerosa prevalecerá nos híbridos de milho médio-tardios. No arroz, ocorrerá o estágio de maturação leitosa, e no algodão – a abertura das cápsulas.

Durante a segunda metade do mês, o déficit de umidade do solo nas segundas culturas se aprofundará e exigirá o aumento das taxas de irrigação. Em muitos locais das regiões de campo, a falta de umidade nas camadas superficiais do solo dificultará a execução de qualidade da aração profunda e do preparo pré-plantio das áreas destinadas à semeadura da colza de inverno. Os períodos agrotécnicos de semeadura para a colza começam na terceira década de agosto.

Em agosto, para as variedades tardias de fruteiras, a atividade nociva da última geração de traças-das-frutas não deve ser subestimada. O tempo relativamente seco durante a maioria dos dias do mês será uma precondição para o aumento das populações de ácaros. Em vinhedos, é necessário monitorar a ocorrência e densidade das larvas da terceira geração da traça-da-uva europeia. As pulverizações de proteção de plantas devem ser realizadas durante as horas mais frescas do dia com produtos que tenham um intervalo pré-colheita apropriado, de acordo com o período de maturação das culturas.

Fonte: NIMH