

Atividades de proteção de plantas no outono no pomar

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



Em setembro, a seca verão-outono continua. É sentida de forma mais distinta nas regiões orientais, onde a precipitação média mensal é de 25-30 l/m². Na parte ocidental do país não ultrapassa os 40-50 l/m².

Em alguns anos, a precipitação média mensal atinge entre 5 e 10 l/m². A temperatura média diária varia de 15 a 20 °C, e após 20 de setembro diminui quase 2-3 °C. A temperatura diária mais alta atinge 28-32 °C, e a temperatura média mais baixa fica entre 3 e 8 °C.

Nestas condições climáticas, o ambiente é favorável à ocorrência e multiplicação de insetos e ácaros multivoltinos. Eles desenvolvem as suas últimas gerações, e a densidade destas populações determinará em

grande parte o nível de danos no ano seguinte. Durante o mês, criam-se condições para a formação de orvalho abundante, que é uma causa de infecções de sarna da macieira e pereira, requeima em tomateiros tardios, entre outras.

Maçãs e peras

No início do mês, deve ser monitorizado o voo da traça-das-maçãs (fim da segunda geração e parcialmente da terceira) e realizados tratamentos onde necessário.

Após uma inspeção minuciosa e deteção de infecções tardias de sarna, bem como para o controlo de doenças que se desenvolvem durante o armazenamento dos produtos, são realizados tratamentos com Topsin M 70 WG - 0,1% ou Top plus 70 WP - 0,1%. Para um bom armazenamento de maçãs e peras e para reduzir podridões e deterioração durante o armazenamento, também é aconselhável realizar um tratamento pós-colheita com Topsin M 70 WG - 0,120%. Após a pulverização, os frutos são deixados a secar e depois acondicionados em câmaras frigoríficas ou em caves profundas e frescas.

Vinhas

Durante este período, o bolor cinzento causa danos significativos na videira desde o início da coloração das bagas até ao consumo. Por isso, em tempo húmido e fresco em setembro, são realizados tratamentos com Topsin M 70 WG - 0,2%. Nesta altura, os adultos da terceira geração da traça-da-uva também estão em voo. As lagartas danificam as bagas de uva em maturação ou já maduras. Para o controlo da praga, adiciona-se à calda fungicida um piretroide registado.

As videiras de um ano são cobertas com terra 3-5 cm acima do ponto de enxertia. Esta operação é realizada no final de setembro.

Em conformidade com a Lei de Proteção das Plantas, os agricultores são obrigados a utilizar apenas produtos fitofarmacêuticos autorizados para a cultura e praga respetivas, e na dose correspondente.

Os produtos fitofarmacêuticos autorizados para comercialização são publicados no sítio web da Agência Búlgara de Segurança Alimentar no endereço eletrónico: <http://www.babh.government.bg/> ou na "Lista de produtos fitofarmacêuticos autorizados para colocação no mercado e utilização" 2019.

Os produtos fitofarmacêuticos devem ser adquiridos apenas de empresas comerciais que detenham uma autorização!

Atenção! Ao trabalhar com produtos fitofarmacêuticos, devem ser observados todos os requisitos de segurança no trabalho, proteção das colónias de abelhas contra intoxicação e proteção do ambiente contra poluição!